

EGOCIN 5%, prašak za oralnu otopinu, za telad, janjad, svinje, kokoši i purane
Za upotrebu u veterinarstvu

1. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

100 g prašak za oralnu otopinu sadržava:

Aktivna supstanca

Oksitetraciklin klorid (OTC) 5 g

Ekscipijensi:

laktoza monohidrat i silicijev dioksid koloidni bezvodni.

2. INDIKACIJE

Liječenje infekcija probavnog, dišnog i urogenitalnog sustava te septikemija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na OTC.

Telad, janjad

Proljevi zarazne etiologije, infekcije pupka, bolesti dišnih organa (komplikaks enzootske bronhopneumonije) i dr.

Svinje

Proljevi (kampilobakterioza, nekrotični enteritis, dizenterija itd.), bolesti dišnih organa (bronhitis, pneumonija, pastereloza, atrofični rinitis itd.), komplikacije nakon kastracije, leptospiroza, eperitrozoonoza, mikoplazmoza i dr.

Kokoši i purani

Nespecifični enteritisi, bolesti dišnih organa (CRD, zarazni sinusitis), pastereloza, heksamitijaza purana i dr.

Upotreba lijeka treba biti na osnovu rezultata antibiograma za izdvojene bakterije.

3. KONTRAINDIKACIJE

Egocin 5 % prašak za oralnu otopinu se ne smije davati:

- odraslim preživačima,
- životinjama s teškim oštećenjima jetre i bubrega,
- životinjama preosjetljivim na djelatnu ili bilo koju pomoćnu tvar.

4. NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko se tetraciklini primjenjuju u razdoblju razvoja zubi, uključujući i kasni graviditet, može doći do žutosmeđeg obojenja cakline i dentina.

Kao i kod drugih tetraciklina, nakon primjene mogu se javiti želučano-crijevni poremećaji, te iznimno alergijske reakcije i fotosenzibilizacija.

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, janjad, svinje, kokoši i purani

6. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Egocin 5% prašak otopi se u vodi za piće ili se pridoda maloj količini obroka ('top dressing'). Otopljen u vodi ima prednost jer ga piju i životinje s povišenom tjelesnom temperaturom koje često odbijaju hranu.

	Egocin 5% doza	Trajanje liječenja
Telad, janjad, svinje	4-6 g/10 kg t.m./dan	4-5 dana
Kokoši i purani	2-10 kg/1 tonu krme 2-4 g/1 L vode za piće	4-5 dana

7. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA

Ako se primjenjuje teladi, janjadi i svinjama putem hrane, Egocin 5 % prašak za oralnu otopinu doda se u obrok neposredno prije upotrebe.

8. KARENCA

Meso i organi teladi, svinja, kokoši i purana: 10 dana

Meso i organi janjadi: 12 dana

Lijek se ne primjenjuje kod goveda sa uspostavljenom funkcijom predželudaca.

Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi.

Lijek se ne primjenjuje kod krava, ovaca i koza čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi.

9. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na tamnom i suhom mjestu, na temperaturi do 25 °C, te izvan dosega djece.

10. POSEBNA UPOZORENJA

Za primjenu na životinjama.

Upotrebu proizvoda treba temeljiti na rezultatima testova osjetljivosti izdvojenih bakterija (antibiogram). Ako to nije moguće, terapiju treba zasnivati na lokalnim (regija, farma) epizootiološkim podacima o osjetljivosti ciljnih bakterija.

Prilikom primjene proizvoda treba uvažiti službene, nacionalne i lokalne preporuke za primjenu antimikrobnih lijekova.

Primjena proizvoda-a koja nije u skladu s preporukama navedenim u uputstvu, može povećati učestalost bakterija otpornih na oksitetraciklin, a zbog pojave križne rezistencije umanjiti učinkovitost liječenja sa svim tetraciklinima.

Prolongiranu i opetovanu primjenu treba izbjeći jer takva praksa može dovesti do razvoja i širenja rezistencije bakterija. To je posebice izraženo kod enterobakterija i salmonela, od kojih su mnogi sojevi već rezistentni.

Životinje kojima je znatno poremećeno opće stanje i smanjen prohtjev za hranom i vodom, ako je moguće, treba liječiti parenteralno.

Lijek ne smijemo davati s mlijekom.

Zbog umanjivanja antimikrobnog učinka, istodobno s oksitetraciklinom ne preporučuje se primjenjivati β-laktamske ili aminoglikozidne antibiotike.

Divalentni ili trovalentni kationi (Mg, Fe, Al, Ca) mogu kelirati s tetraciklinima. Stoga tetracikline ne treba primjenjivati s antacidima, gelovima koji sadrže aluminij te vitaminskim ili mineralnim pripravcima jer mogu nastati netopljivi kompleksi koji umanjuju resorpciju antibiotika.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lijek životinjama

Osobe preosjetljive na djelatnu tvar ili ako im je savjetovano da ne rade s ovakvim proizvodom ne smiju rukovati s njim.

Prilikom pripreme i primjene proizvoda treba nositi zaštitne rukavice i polumasku s respiratorom za jednokratnu upotrebu (europski standard EN 149) ili respirator za višekratnu uporabu (europski standard EN 140) s filtrom (EN 143). Tokom primjene ne smije se jesti, piti ili pušiti. Nakon upotrebe treba oprati ruke.

Treba pažljivo rukovati s ovim proizvodom kako bi se izbjeglo izlaganje (udisanje, dodir s kožom i očima), i uz to se pridržavati svih mjera opreza. Ukoliko proizvod dođe u dodir s kožom ili očima, treba ih isprati s puno vode. Ako se nakon izlaganja ovom proizvodu javi nadražaj, treba potražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu ili etiketu. Znatno teže reakcije su oteknuće lica, usana ili okoline očiju te otežano disanje, pri čemu je nužna hitna medicinska pomoć.

11. POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim lijekom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa važećim propisima (Sl. novine FBiH 33/03-Zakon o upravljanju otpadom).

12. DATUM I BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

UP-I-06-2-24/17-768/18 J.B; od 05. septembra 2018. godine

13. NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

14. PAKOVANJE

Kesice od 25 g i 250 g praška.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet u BiH

KRKA FARMA d.o.o., Džemala Bijedića 125 A, 71 000 Sarajevo

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje serije u promet:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija.