

**Prijedlog uputstva za upotrebu**

**Engemycin Spray**

**(za primjenu na životinjama)**

Proizvođač: Intervet International B.V.  
Adresa: Wim de Körverstraat 35, Holandija  
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH  
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

Engemycin Spray

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Oksitetraciklin hidroklorid 5 g (jednako je 4.63 g oksitetraciklina) po bočici.

## DJELOVANJE

Oksitetraciklin se proizvodi fermentacijom *Streptomyces rimosus*. Širokog je antimikrobnog spektra i djeluje protiv širokog spektra gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, te pojedinih mikoplazmi, protozoa, rikecija i hlamidija. Oksitetraciklin je bakteriostatik i djeluje tako što inhibira sintezu proteina unutar ćelije.

Nakon topikalne primjene, oksitetraciklin se u kožu resorbuje u zanemarivim količinama, a dolazi u direktan dodir s bakterijama na koži i u površinskim lezijama na vanjskim površinama tijela. Plava marker boja koristi se za označavanje veličine tretiranog područja.

## INDIKACIJE

Tretman inficirane kože ili lezija papaka goveda, ovaca i svinja, uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na oksitetraciklin, kao što su: digitalni dermatitis goveda, zarazna šepavost ovaca i svinja koju uzrokuje *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* i druge *Fusobacterium spp* i *Bacteroides spp.*, ili inficirane rane nakon hirurških zahvata ili fizičkih povreda, npr. griženje repa kod svinja, kastracija prašćića, ogrebotine i uboji kod goveda i ovaca. Lijek se ne smije upotrebljavati za terapiju mliječne žlijezde/vimena.

## KONTRAINDIKACIJE

Lijek je kontraindicirano upotrebljavati na sisama/vimenu krava, odnosno u toku laktacije na mliječnoj žlijezdi, da bi se spriječilo kontaminiranje mlijeka.

## NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

## CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje.

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Dobro protresti prije upotrebe. Prije primjene dobro očistiti površinu koja će se tretirati, naprskati proizvod 1-2 sekunde, na udaljenosti od 15-20 cm, dok područje ne dosegne homogenu boju. Ponoviti tretman svakih 12 sati bar 1-3 dana, ovisno o procesu zacjeljivanja.

## UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU

Da bi se postigli najbolji rezultati u slučaju oštećenja papaka, treba potpuno očistiti područje, u potpunosti očistiti strani materijal, eksudat i nekrotična tkiva. Držati životinje na suhom tlu 12 sati nakon svake primjene.

Ne sprejati u ili blizu očiju životinja.

## KARENCA

Nula dana.

Lijek se ne smije upotrebljavati za terapiju mliječne žlijezde/vimena.

## ČUVANJE LIJEKA

Na tamnom mjestu, pri temperaturi do 25 C. Bočica je pod pritiskom, stoga zaštititi od sunčevog svjetla i ne izlagati temperaturama koje prelaze 50°C.

**POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

**DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17-751/18 J.B; od 13. 06. 2018. godine

**OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Sprej bočica od 200 ml.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept.

**Rok upotrebe:** 3 godine

ATCvet kod: QD06AA03

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35; 5830 A A Boxmeer; Holandija

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo.