



ALBADRY PLUS®

*suspenzija za intramamarnu primjenu
liječenje mastitisa krava u razdoblju suhostaja*

SASTAV

Jedan injektor Albadyr® Plus u 10 ml suspenzije sadržava:

Novobiocina u obliku novobiocin-natrija	400 mg
Prokain benzilpenicilina	200.000 i.j.
Aluminijeva monostearata	-
Uljnoga nosača	do 10 mL

DJELOVANJE

Antibiotici uvršteni u pripravak djeluju izrazito antibakterijski protiv uzročnika mastitisa. Pritom novobiocin djeluje protiv stafilokoka (*Staphylococcus aureus*), a očituje i dobar učinak protiv streptokoka. Penicilin je lijek izbora u suzbijanju streptokoknih mastitisa (*Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*), a djelotvoran je i protiv stafilokoka.

INDIKACIJE

Standardno, to jest uobičajno liječenje mastitisa krava u razdoblju suhostaja uzrokovano bakterijskim vrstama *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* i *Streptococcus uberis*. Pomoć u sprječavanju ljetnih mastitisa krava. Dokazano je da su penicilin i novobiocin in vitro učinkoviti protiv bakterije *Actinomyces pyogenes* uzročnika ljetnog mastitisa.

KONTRAINDIKACIJE

Albadyr Plus® ne smije se primjenjivati u krava u kojih je do zasušenja preostalo manje od 30 dana.
Ostale kontraindikacije za sada nisu poznate.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Krave se tretira na početku suhostaja, to jest prilikom zasušenja. Prije aplikacije mora se potpuno izmusti vime. Prije i.mam. aplikacije pripravka Albadyr® Plus vime treba oprati u mlakoj vodi, a sise dezinficirati odgovarajućim antiseptikom. Injektor se zagrije na temperaturu tijela i dobro protrese. Ukloni se zaštitna kapica s injektora, a njegov konični nastavak oprezno uvede u sisni kanal.

Prilikom zasušenja u svaku četvrt oboljelog vimena utisne se sadržaj jednog injektora (10 mL).

Nakon aplikacije, vime se izmasira od sisa prema 'bazi' da bi se suspenzija ravnomjerno raspodijelila po mliječnoj cisterni i mliječnim kanalčićima.

NUSPOJAVE

Dosad nisu poznata.

NAPOMENE I MJERE OPREZA

Albadry® Plus se ne smije upotrebljavati u krava tijekom laktacije. Suspenzija se mora primijeniti najkasnije 4 sedmice prije očekivanog termina telenja.

Nakon primjene injektore valja neškodljivo ukloniti.

Budući da pencilinski i cefalosporinski antibiotici mogu uzrokovati alergijske reakcije, preosjetljive osobe moraju izbjegavati izravni dodir pripravka s kožom i sluznicama.

KARENCIJA

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 30 dana.

Mlijeko: 84 sata nakon telenja.

Ako se krave otele za manje od 30 dana nakon aplikacije, mlijeko se može koristiti 34 dana nakon i/mam primjene lijeka.

NAČIN ČUVANJA

Pri sobnoj temperaturi (15Y-25YC) i izvan dosega djece.

ROK VALJANOSTI

Označen je na opremi (3 godine).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Kutija s 20 injektora x 10 mL u vakuminiziranoj foliji.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-711-1/13 od 10.05.2013. godine

PROIZVOĐAČ

Zoetis Belgium, Belgija

ZASTUPNIK

PFIZER BH d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH