

Eurican DAP

Atenuirana vakcina protiv štenećaka, adenovirusa tipa2 i parvovirusa tipa 2

Sastav: Jedna doza vaccine (1 ml) Eurican DAP sadržava:

- Liofilizirana atenuirana virusna vakcina (DAP) u bočici:

Virus štenećaka $\geq 10^{4.0}$ CCID₅₀, Pasji adenovirus (CAV₂) $\geq 10^{2.5}$ CCID₅₀, Virus parvoviroze pasa $\geq 10^{4.9}$ CCID₅₀

Medij za otapanje koliko je dosta do 1 doze

Djelovanje:

U vakciniranih zdravih pasa cijepivo Eurican DAP® potiče tvorbu specifičnih protutijela, a time i zaštitu protiv infekcije virusima štenećaka, adenovirusa, parvoviroze.

Indikacije:

Aktivna imunizacija zdravih pasa protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa (CAV₂) i parvoviroze.

Način primjene i doze:

Liofiliziranu virusnu komponentu vakcine treba resuspendirati tekućom bakterijskom vakcinom neposredno prije primjene. Doza vakcine je za sve pse 1 mL. Vakcnu Eurican® DAP se aplicira s.c. prema sljedećem programu:

Osnovno cijepljenje (primovakcinacija) Štenad se prvi put cijepi u dobi od 7 tjedana. Drugo cijepljenje se obavi 4 tjedana poslije prvog, ali ne prije nego li životinja navrši 12 tjedana.

Docjepljivanje (revakcinacija, booster) docjepljivanje se vrši 12 mjeseci poslije kopletnjane primarne vakcinacije.

Napomene i mjere opreza:

Vakcina se mora upotrijebiti neposredno nakon resuspendiranja liofilizirane komponente s diluentom. Vakcinirati se smije samo potpuno zdrave životinje koje su dehelminzirane najmanje 10 dana prije vakcinacije. Vakciniranim jedinkama treba tijekom nekoliko dana onemogućiti dodir s ostalim psima i poštovati ih tjelesnih npora dok ne postignu zadovoljavajući imuni odgovor. Pri vakciniranju treba poštovati osnovna pravila aseptičnog rada. Za injiciranje se mora koristiti sterilne štrcaljke i igle, bez tragova dezinficijensa.

Karencija: "0" dana.

Interakcije:

Nema podataka o sigurnosti i učinkovitosti ove vakcine kod usporedne primjene drugih lijekova. Vakcnu se u štrcaljki ne smije miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Nuspojave:

Na mjestu aplikacije može nastati mala oteklina, koja se povuče za nekoliko dana. Nakon vakcinacije životinjama se može povisiti tjelesna temperatura. Psi se mogu senzibilizirati na sastojke vakcine te se pokatkad javi reakcije preosjetljivosti. U takvim okolnostima treba poduzeti simptomatsko liječenje - pr. adrenalin, antihistaminici, ev. kotikosteroidi. U slučaju predoziranja životinje mogu biti prolazno potištene i javi se lokalna reakcija.

Graviditet i laktacija:

Nema izvješća o štetnim učincima ove vakcine na ženke tijekom graviditeta.

Način čuvanja:

Na tamnom mjestu, pri temperaturi od 2-8°C (hladnjak) i izvan dosega djece. Vakcina se ne smije smrznuti.

Način izdavanja : Na veterinarski recept.**Oprema :**

Kartonska kutija s 10 x 1 i 50 x 1 dozom vakcine: Jednu dozu čini jedna staklena bočica sa svjetložutim osuškom (DHPPI₂) i jedna bočica u kojoj je 'diluent' - suspenzija (L).

Broj i datum odobrenja : UP-I-06-2-24/17-2019/16 J.B., od 05. 04. 2017. godine

Proizvođač: Merial, Lyon, Francuska.

Zatupnik i ekskluzivni uvoznik : ARNIKA VETERINA SA d.o.o., Ismeta Alajbegovica Serbe 7