

## Eurican DAPPi - L multi

Atenuirana vakcina protiv štenećaka, adenovirusa tipa 2 i parvovirusa tipa 2

### Sastav: Jedna doza vakcine Eurican DAPPi L multi I sadržava:

- Liofilizirana atenuirana virusna vakcina (DAPPi) u bočici:

Virus štenećaka  $\geq 10^{4.0}$  CCID<sub>50</sub>, Pasji adenovirus (CAV<sub>2</sub>)  $\geq 10^{2.5}$  CCID<sub>50</sub>, Virus parvoviroze pasa  $\geq 10^{4.9}$  CCID<sub>50</sub>, Parainfluenca tipa 2  $> 10^{4.7}$  CCID<sub>50</sub>

Jedna doza 1ml suspenzije sadržava

Inaktiviranu Leptospiru interrogans serogrupa i serovar Canicola

Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Icterohaemorrhagiae

Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Grippotyphosa

Medij za otapanje koliko je dostatno do 1 doze

### Djelovanje:

U vakciniranih zdravih pasa cjepivo Eurican DAPPi- L multi® potiče tvorbu specifičnih protutijela, a time i zaštitu protiv infekcije virusima štenećaka, adenovirusa, parvoviroze i parainfluence tipa 2 i navedenih tipova Leptospiroze

### Indikacije:

Aktivna imunizacija zdravih pasa protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa (CAV<sub>2</sub>) parvoviroze, parainfluence-2 (respiratornih infekcija) i Leptosiroze

### Način primjene i doze:

Liofiliziranu virusnu komponentu vakcine treba resuspendirati tekućom bakterijskom vakcinom neposredno prije primjene. Doza vakcine je za sve pse 1 mL. Vakcinu Eurican® DAPPi- L multi se aplicira s.c. prema sljedećem programu:

**Osnovno cijepljenje** (primovakcinacija) Štenad se prvi put cijepi u dobi od 7 tjedana. Drugo cijepljenje se obavi 3 do 5 tjedana poslije prvog, ali ne prije nego li životinja navršila 12 tjedana.

**Docjepljivanje** (revakcinacija, booster) docjepljivanje se vrši 12 mjeseci poslije kopletirane primarne vakcinacije.

### Napomene i mjere opreza:

Vakcina se mora upotrijebiti neposredno nakon resuspendiranja liofilizirane komponente s diluentom. Vakcinirati se smije samo potpuno zdrave životinje koje su dehelmintizirane najmanje 10 dana prije vakcinacije. Vakciniranim jedinkama treba tijekom nekoliko dana onemogućiti dodir s ostalim psima i poštediti ih tjelesnih napora dok ne postignu zadovoljavajući imuni odgovor. Pri vakciniranju treba poštovati osnovna pravila aseptičnog rada. Za injiciranje se mora koristiti sterilne štrcaljke i igle, bez tragova dezinficijensa.

Karencija: "0" dana

**Interakcije:**

Nema podataka o sigurnosti i učinkovitosti ove vakcine kod usporedne primjene drugih lijekova. Vakcinu se u štrcaljki ne smije miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

**Nuspojave:**

Na mjestu aplikacije može nastati mala oteklina, koja se povuče za nekoliko dana. Nakon vakcinacije životinjama se može povisiti tjelesna temperatura. Psi se mogu senzibilizirati na sastojke vakcine te se pokatkad jave reakcije preosjetljivosti. U takvim okolnostima treba poduzeti simptomatsko liječenje - pr. adrenalin, antihistaminici, ev. kortikosteroidi. U slučaju predoziranja životinje mogu biti prolazno potištene i javi se lokalna reakcija.

**Graviditet i laktacija:**

Nema izvješća o štetnim učincima ove vakcine na ženke tijekom graviditeta.

**Način čuvanja:**

Na tamnom mjestu, pri temperaturi od 2-8°C (hladnjak) i izvan dosega djece. Vakcina se ne smije smrznuti.

**Način izdavanja :** Na veterinarski recept.

**Oprema :**

Kartonska kutija s 10 x 1 i 50 x 1 dozom vakcine: Jednu dozu čini jedna staklena bočica sa svjetložutim oLškom (DHPPI<sub>2</sub> - L multi2) i jedna bočica u kojoj je 'diluents' - suspenzija (L).

**Proizvođač:** Merial, Lyon, Francuska.

**Zatupnik i ekskluzivni uvoznik :** ARNIKA VETERINA SA d.o.o., Ismeta Alajbegovica Serbe 7