

FATROCORTIN

Injekcioni rastvor

SASTAV 1 ml:

Deksametazon 1 mg

DJELOVANJE

Lijek je na bazi deksametazona (16 alfa metil -9-alfa flor-prednizolon). Vrlo je jak kortikosteroid. U odnosu na kortizon i kortikosteron (prirodni prekursori) ima jako djelovanje protiv upala (inflamacija) i neuroglukogeno djelovanje; sa manjim efektima na metabolizam na oligominerala i vode. Koristi se i u humanoj medicini. U veterini se koristi protiv alergijskih infekcija,poremećaja metabolizma glikolipida (ketoze)

INDIKACIJE

Koristi se kod ketoza, reumatoidnog artritisa, kod svih upalnih procesa na zglobovima (tendinitis, bursitis, sinovitis ,hidroartroze) goveda i konja, edema svinja, dermatoze pasa, stresnih situacija, akutnih mastitisa krava i krmaca.

NACIN UPOTREBE I DOZIRANJE

Primjenjuje se intramuskularno i intravenozno.

DOZE

Telad,svinje i zdrebad 5 ml/zivotinji dnevno ili 0,05 -0,1 mg / kg zive mase;

goveda,konji 10 ml/zivotinji dnevno ili 0,02-0,04 mg/kg zive mase;

prasad 0,5-1,0 ml /zivotinji dnevno ili 0,05-0,2 mg/zive mase;

psi i macke 0,5-1,0 ml/zivotinji dnevno il 0,05-0,2 mg /zive mase

Dnevne doze mogu biti ponovljene po preporuci veterinara.

Kod upalnih procesa zglobova preporucuje se davanje lijeka direktno u oboljeli zglob.

KARENCIJA

Meso i organi: 16 dana goveda

Meso i organi: 3 dana svinje

Meso i organi: 24 dana konji

Lijek se ne moze koristiti tokom gravidnosti i dojenja, jer primjena u ranom stadiju graviditeta moze izazvati anomalije fetusa. Primjena u posljednjoj fazi graviditeta moze izazvati prijevremeni porod i abortus.

Mlijeko krava: 72 sata

Lijek se upotrebljava kod konja čije mlijeko se koristi za ishranu ljudi.

NACIN IZDAVANJA

Veterinarski recept

NACIN CUVANJA

Cuva se na suhom, hladnom i tamnom mjestu.

ROK UPOTREBE

5 godina

NACIN PAKOVANJA

Bocice sa 100 ml

BROJ I DATUM RJEŠENJA: UP-I-06-2-24/17-1295/15 J.B, 04. 02. 2016. godine

NAZIV PROIZVOĐAČA: "FATRO" S.p.A. Italija

NAZIV ZASTUPNIKA: "SINTOFARM ADRIATICA" d.o.o. Orašje