

FATROXIMIN SPRAY TOPICO

Sprej za spoljnu upotrebu

SASTAV

Rifaximin 0,5 g

NACIN DJELOVANJA

Fatroximin sprej je napravljen od rifaximina – sintetickog antibiotika iz roda ansamicine. Mehanizam djelovanja je zasnovan na interakciji sa RNA polimerazom koja je ovisna od DNA, te se na taj nacin blokira proizvodnja protein. Lijek djeluje na Gram + bakterije (streptokoki, stafilokoki, aktinomikoze, clostridije) I na pojedine Gram – bakterije.

Ne resorbuje se u organizam prilikom njegove aplikacije na ostecenim djelovima organizma zivotinja.

INDIKACIJE

Preporucuje se kod lijecenja koznih infekcija, dermatitisa, interdigitalnih ostecenja, piodermatitisa, rana, cireva i traumatskih rana.

DOZIRANJE I NACIN UPOTREBE

Treba dobro promuckati prije upotrebe

Primjeniti samo lokalno. Očistiti dio površine tkiva koji treba tretirati, pošpricati 1-3 sekunde, koji odgovaraju otprilike 2-9 mg rifaksimina za aplikaciju. Tretman se može ponoviti 1-2 puta na dan sve do ozdravljenja , u toku uglavnom 3-5 dana. U slučaju truleži ili drugih lezija treba dobro očistiti i izjednačiti pažljivo osteceno tkivo. Na taj način da se izloži direktno inficirani dio tkiva Fatroximin sprejom, pazeći da se proizvod aplicira na svu inficiranu površinu tkiva.

Kod blagih infekcija i zona koje su malo zahvaćene abrazijom , ozdravljenje može biti postignuto čak i sa samo jednom primjenom spreja.

NAPOMENA

Pri upotrebi lijeka izbjegavati kontakt sa sluznicama.

KARENCIJA

Meso i iznutrice 0 dana

Mlijeko 0 dana

NACIN IZDAVANJA

Veterinarski recept

NACIN CUVANJA

Cuvati na suhom i mracnom mjestu

ROK UPOTREBE

3 godine

NACIN PAKOVANJE

Boca spreja od 200 ml, koja odgovara 142 g.

Broj i datum rješenja: UP-I-06-2-24/17- 1288/15 J.B, 04. 02. 2016. godine

Naziv proizvođača: "FATRO" S.p.A. Italija

Naziv zastupnika: "SINTOFARM ADRIATICA" d.o.o. Orašje