

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

FATROXIMIN ENDOUTERINO SCHIUMA

**Endouterina pjena za krave, bivolice i kobile koje ne služe u ishrani
ljudi**

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 sprej boca (bombola od 13,4 g) sadrži:

Rifaksimín 100 mg

Nosača do 13,40 g

DJELOVANJE

Proizvod je endouterina pjena na bazi sintetskog antibiotika rifaximina, koji je iz porodice ansamicina. Mehanizam djelovanja rifaximina se ogleda u interakciji RNA-polimeraze koja je ovisna od DNA i ona sprečava sintezu proteina bakterija.

Spektar djelovanja rifaksimina podrazumjeva da uglavnom djeluje na Gram + bakterije, (streptokoke, stafilokoke, klostridije, aktinomicete, fusobakterije), kao i neke od Gram – bakterije, uključujući anaerobe.

INDIKACIJA

Fatroximin pjena se koristi se u liječenju bakterijskih infekcija ženskih genitalnih organa krava, bivolica i kobilica, i to: endometritisa akutnog i hroničnog, piometritisa, metritisa, cervicitisa i vulvovaginitisa, vaginitisa izazvanih Gram + bakterijama, (streptokoke, stafilokoke, klostridije, aktinomicete, fusobakterije), kao i nekim od Gram – bakterija, uključujući anaerobe.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Primjenjuje se intra/uterino.

Krave/bivolice: kod endometritisa, piometritisa, metritisa i cervicitisa 1/2 do 2 bombole (što odgovara 50 do 200 mg rifaximina po životinji). Količina lijeka koja se koristi zavisi i od veličine uterusa životinje. Kod piometritisa obavezno prije aplikacije lijeka očistiti sadržaj iz šupljine uterusa, pa tek onda aplicirati lijek.

Kod vulvovaginitisa: jednu + jednu bombolu (što odgovara 100 mg + 100 mg lijeka) u razmaku od 24 sata.

Kobile: kod endometritisa akutnih i hroničnih aplicirati 1-4 bombole što odgovara 100-400 mg lijeka) po životinji, ovisno o veličini uterusa.

Prije primjene bombolu dobro protresti.

NAČIN PRIMJENE

Krave/bivolice: Prvo se fiksira cerviks rektalno i nakon dezinfekcije vulvarnih usta se ubaci kateter u cerviks i onda se bombola poveže sa kateterom i aplicira lijek pod pritiskom na bombolu.

Kobile: Cerviks vaginalno lijevom rukom fiksirati i ubaciti kateter u vaginu i ubaciti ga duboko u unutrašnjost uterusa, zatim povezati kateter sa bombolom i priskom ruke ubrizgati sav sadržaj u uterus životinje.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne primjenjivati lijek kod životinja koje su osjetljive na rifaksimina ili na antibiotike iz grupe anzamicina.

KARENCA

Irelevantno: Lijek se **ne** upotrebljava na životinjama koje se koriste ili se njihovi proizvodi koriste, u ishrani ljudi.

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, svježem i tamnom mjestu.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

ROK UPOTREBE

3 godine

NAČIN PAKOVANJA

Pakovanje 6 bombola (sprej bočica) i rukavice za jednokratnu upotrebu.

BROJ I DATUM ODOBRENJA:UP-I-06-2-24/17-985/17 J.B, 30. oktobra 2017. godine

Vlasnik i proizvođač: **Fatro** s.p.a Italy www.fatro.it

Uvoznik i distributer: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje** BiH.
www.sintofarm-adriatica.com