

ALBENDAZOL 10% GANADEXIL

Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: Albendazol 100mg; ekscipijens q.s. 1ml

Indikacije i ciljane vrste:

Goveda: kontrola i liječenje verminoza koju uzrokuju parazitske gliste različitih lokacija u organizmu, koje su aktivne u raznim oblicima (adulti, larve ili jajašca) :

- Gastrointestinalne nematode: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Oesophagostomum radium, Nematodirus helvetianus.
- Plućne nematode: Dictyocaulus vivoarus.
- Cestode (pantljičare) : Moniezia expansa
- Jetrene trematode: Fasciola hepatica (zreli oblici)

Terapijski oblik: Oralna suspenzija

Doziranje i administracija :

Govedo: administracija u pojedinačnoj dozi: 0.75ml Albendazol 10% Ganadexila na 10 kg tjelesne mase u slučaju infestacije gastointestinalnim nematodama, plućnim nematodama i cestodama.

1ml na 10 kg tjelesne mase u jednoj dozi, u slučaju infestacije jetrenim trematodama (Fasciola spp.)

Oralna primjena

Pojedinačna, administracija specijalno za svaku životinju.

Koristiti standardni ubacivač za uvođenje što dublje moguće u usta. Promućati prije upotrebe.

Preporuka za korištenje:

Albendazol 10% Ganadexil se primjenjuje kao pojedinačna doza tokom perioda godine utvrđenom za svaku vrstu stoke.

Čišćenje bi trebalo da slijedi slijedeći protokol:

- Prije programa vakcinacije
- Kada je produktivnost životinje reducirana stepenom invazije parazitima
- Kod nedavno uvedenih životinja , doza bi trebala biti administrirana po njihovom dolasku na farmu. Trebale bi biti držane tokom najmanje 8 sati bez ispase.
- Telad: tretirati ih jedan i po mjesec nakon ispaše, ponavljajući svakih jedan i po mjesec.
- Krave (odrasle) tretirati ih u jesen i prije smještaja u štalu , dijareja povezana sa Ostertagia spp. može se pojaviti u zimu; u ovom slučaju tretirati ih dvokratno, ostavljajući interval od 4 noći između

Tretman ponoviti u proljeće i ljetu.

Kontraindikacije, sporedni efekti i interakcije:

Nisu poznate.

Korištenje u gravidnosti i u laktacionom periodu:

Ne prekoračiti preporučenu dozu tokom prvih mjeseci gestacije.

Predoziranje:

Sigurnosna granica je do 5 terapijskih doza. Nivo tolerance oralne primjene je 7.5ml/10kg tjelesne mase. Ukoliko se desi greška i bude administrirana visoka doza rezultat je anoreksija, letargija i motorna inkordinacija. U ovom slučaju korištenje lijeka treba biti prekinuto i primjenjen simptomatski tretman.

Karenca:

Meso i organi goveda : 14 dana

Mlijeko krava : 4 dana (8 mužnji)

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način čuvanja: Zaštiti od utjecaja vlage, sunca ili vrućine. Držati van dosega djece.

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: boca od 100ml, 500ml ,1lit i 5lit, 6lit

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Spanija

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica

Broj rješenja izdatog od FMPVS BiH: UP-I- 06-2-24/17-1308/15 J.B. , od 19.11.2015.