

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

FILOLINC 400

Prašak za oralni rastvor za svinje i brojlere

SASTAV

1 g proizvoda sadrži:
Linkomicin (kao hidroklorid) 400 mg
Nosač: Laktoza do 1 g

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Svinje i brojleri.

INDIKACIJE

Koristi se u liječenju infekcija izazvanih djelovanjem bakterija i Mikoplazmi osjetljivih na linkomicin (npr. *Brachyspira hyodysenteria* i enzotični polmonitis izazvan *Mycoplasma pneumonia* i nekrotski enteritis koji izaziva *Clostridium perfringens*).

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na linkomicin. Ne koristiti za preživače, konje, kuniće, hrčke, činčile i indijskih prasića koji bi mogli biti izloženi riziku kolateralnih efekata u gastrointestinalnom traktu od teških do fatalnih.

Moguće je uočiti mekanu stolicu, kao i dijareju i oticanje u analnoj regiji na početku liječenja. Rijetko se može opaziti crvenjenje kože ili iritacija. Ovi problemi su prolaznog

karaktera i nestaju spontano nakon 5 – 8 dana bez da se prekine terapija. Ukoliko se pojave druge teže reakcije odmah obavijestiti veterinaru.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Lijek je u prahu koji treba dobro rastvoriti u vodi za piće za peroralnu upotrebu.

- Svinje:
 - Svinjska dizenterija: dnevna doza je 10 mg linkomicina/1 kg žive mase, tokom 5 – 10 dana.
 - Mikoplazma pneumonie: 10 mg linkomicina/1 kg žive mase tokom jednog dana.

Proizvod se mora rastvoriti u količini vode za pojenje koja se konzumira u toku dana i to na sljedeći način: u 4,5 l vode za piće treba rastvoriti 150 mg linkomicina. Za terapiju se prvo napravi osnovni rastvor (izmjeriti 7,5 g proizvoda i rastopiti ga u 1 l vode) i potom pomiješati 11 ml osnovnog rastvora u svaku litru vode za piće. U toku liječenja svinjske dezinterije važno je primjeniti terapiju tokom 10 dana, a onda još bar 5 dana nakon prestanka simptoma.

- Brojleri:
 - Nekrotični eneteritis (izazvan Clostridium perfringens): dnevna doza je 5 mg linkomicina/1 kg žive mase tokom 7 dana.

Proizvod se mora davati u dozi od 5 mg linkomicina i to 15 mg/1 l vode što odgovara 7,5 g proizvoda/200 l vode. Za pripremu osnovnog rastvora uzeti 7,5 g filolinka 400 i rastvoriti u jednoj litri vode. Od ovog osnovnog rastvora izmjeriti 5 ml za svaki litar vode za piće. Ljekovita pripremljena voda mora biti jedini izvor za piće tokom dana za životinje.

UPOZORENJE

Miješati isključivo u vodi za piće. Treba izbjegavati učestalo i produženo korištenje, poboljšavajući uvjete držanja životinja higijenom i dezinfekcijom.

Posebne mjere opreza kod primjene:

i) Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Prah za oralni rastvor je namjenjen rastvaranju u vodi i ne može se koristiti u izvornom obliku.

Čista voda za piće sa rastopljenim lijekom mora biti jedini izvor vode za napajanje životinja tokom terapije i svaki dan treba pripremiti novi rastvor.

Ne davati u čvrstoj hrani. Zbog mogućih varijacija vremenskih i geografskih uvjeta na osjetljivost ciljanih mikroba na Linkomicin preporuča se obaviti bakteriološki nalaz i testove osjetljivosti.

Neodgovarajuća upotreba proizvoda u odnosu na ono što je navedeno u Opisu karakteristika i uputstvima za upotrebu proizvoda mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na linkomicin i smanjiti njegovu djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima iz iste ili druge klase zbog moguće pojave unakrsne otpornosti. Pijenje ljekovite vode može biti zamjenjeno u odnosu na razvoj bolesti. U slučaju nedovoljnog pijenja vode treba liječiti životinje parenteralno koristeći odgovarajući proizvod u injekcijama i po uputama veterinarskog liječnika.

ii) Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Linkomicin može izazvati preosjetljivost (alergiju) nakon injektiranja, udisanja, gutanja ili u kontaktu sa kožom.

Alergijske reakcije na ovu tvar mogu biti ozbiljne.

Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na Linkomicin moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom.

Ne gutati; U slučaju nenamjernog gutanja, odmah se treba obratiti liječniku i pokazati etiketu ili prospekt proizvoda. Preporuča se tokom rukovanja i pripremanja rastvora nositi masku za lice, zaštitne naočari i rukavice. Izbjegavati udisanje praha i kontakt sa kožom i očima. U slučaju slučajne kontaminacije kože ili očiju isprati dobro vodom.

Ukoliko iritacija ostane, konsultovati liječnika.

Oprati dobro ruke nakon upotrebe lijeka.

INKOMPATIBILNOST

Ovaj lijek ne treba miješati sa drugim veterinarskim lijekovima. Linkomicin se ne smije davati zajedno sa baktericidnim antibioticima iz porodice makrolida.

Može potencirati efekat neuromuskularno blokiranje anestetika i sredstva za relaksaciju mišića.

NAČIN ČUVANJA

Nema posebnih mjera opreza za čuvanje. Nakon otvaranja lijeka zatvoriti pakovanje tako da se zaštiti od svijetla i vlage.

KARENCA

- Svinje:
 - meso i organi svinja: 4 dana.
- Pilići:
 - meso i organi peradi: 5 dana.
 - Lijek se ne koristi kod koka nosilja.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na Veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Rok trajanja originalnog pakovanja je 2 godine.

Nakon otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 6 mjeseci.

Nakon rastvaranja veterinarskog lijeka u vodi, rok trajanja je 24 sata.

NAČIN PAKOVANJA

1 kg i 5 kg.

UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-769/16 J.B., od 24. 06. 2016. godine

PROIZVOĐAČ: **Filozoo Srl**; *Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)*
Tel: +39059637311