

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

FILOSTIN 120 LIQUIDO

**Rastvor za peroralnu primjenu za svinje, telad, brojlere, ćurke, kuniće
i koke nosilje**

SASTAV

Jedan gram proizvoda sadrži:

Aktivna supstanca : Colistin Sulfat 120 mg (koji odgovara 2.400.000 IJ/g)

Nosač: do 1.000 mg

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Svinje, telad, brojleri, ćurke, kunići i koke nosilje.

INDIKACIJE

Lijek se koristi u liječenju infekcija gastro-intestinalnog trakta uzrokovanih gram negativnim bakterijama (E.coli, Salmonelama sp., Klebsiela, Pasterela, Bordetela, Shighela i dr.). Lijek smanjuje (neutralizira) djelovanje endotoksina bakterija u ćelijskim tečnostima domaćina – životinje.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na Colistin. Ne koristiti proizvod kod konja, posebno kod ždrijebadi jer kod njih može izazvati pojavu kolitisa (promjena ravnoteže gastro-intestinalne mikroflore).

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Da bi se izbjeglo nedovoljno doziranje lijeka, treba ustanoviti, na najprecizniji način, tjelesnu težinu životinja. Lijek, prije upotrebe, treba dobro rastvoriti u vodi za piće.

- *Telad koja doje*: Umiješati u vodi 4,2 do 5,0 ml proizvoda/100 kg tjelesne težine teladi tokom 3 – 7 dana.
- *Svinje*: Upotrebljava se samo za svinje težine do 35 kg i to 4,2 -5,0 ml proizvoda/100 kg tjelesne težine, tokom 3 – 7 dana.
- *Ćurke, koke nosilje, kunići i brojleri*: 5,0 – 6,0 ml Colistina/100 kg tjelesne težine, tokom 3 – 7 dana.

UPOZORENJE

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Uzimanje vode sa lijekom od strane životinja može se mijenjati u odnosu na bolest. Za one životinje kod kojih se uoči smanjeno uzimanje vode treba primjeniti liječenje parenteralnim putem koristeći odgovarajući proizvod u vidu injekcija po savjetu veterinarskog lječnika.

Učestalo korištenje ili produženo treba izbjeći, poboljšavanjem uvjeta držanja i putem čistoće i dezinfekcije.

Treba posebno posvetiti pažnju poboljšanju uzgoja da bi se izbjegle bilo kakve situacije stresa.

Kolistin stvara nepovoljne uvjete za razvoj Gram – bakterija u probavnom traktu. Nakon oralnog uzimanja, postižu se visoke koncentracije lijeka u gastrointestinalnom traktu, na ciljanom mjestu, zbog njegove slabe apsorpcije. Ovi faktori ukazuju da je duže liječenje od preporučenog nepotrebno.

Posebne mjere opreza kod primjene:

Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Primjena proizvoda treba biti bazirana na testovima osjetljivosti u odnosu na izolirane bakterije kod životinja. Ukoliko to možda nije moguće, terapija treba biti bazirana na lokalnim epidemiološkim informacijama (regije ili preduzeća) zbog mogućih varijacija koje se odnose na osjetljivost ciljanih bakterija.

Ne koristiti u čvrstoj stočnoj hrani.

Ne ostavljati rastvor lijeka na dohvrat životinja koje nisu pod terapijom ili divljih životinja. Kolistin je lijek posljednje instance u humanoj medicini za liječenje infekcija uzrokovanih nekim multi-rezistentnih bakterija. U cilju da se smanji na minimum bilo kakav potencijalni rizik koji se može pripisati raširenom primjenom kolistina, primjena mora biti ograničena na liječenje bolesti i nije predviđeno za profilaksu.

Gdje je to moguće, kolisin treba biti korišten samo na bazi testova osjetljivosti/senzibiliteta.

Primjenjivanje lijeka koje nije u skladu sa uputstvima može dovesti do neuspjeha u liječenju i porastu bakterija otpornih na kolistin.

Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Pomješati dobro u vodu za piće. Primjeniti uobičajene mjere procedura pripreme ili davanja proizvoda; nisu neophodne posebne mjere opreza kod radnika, u svakom slučaju je dobro izbjegavati direktan kontakt; savjetuje se korištenje maske i zaštitnih rukavica pogodnih za rad sa proizvodom.

Ne jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe proizvoda. Nakon korištenja oprati dobro ruke . U slučaju nenamjernog kontakta sa kožom ili očima, isprati dobro sa vodom i sapunom. Ukoliko je iritacija uporna obratiti se liječniku.

Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na kolistin trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarskim lijekom.

KARENCA

- Brojleri i ćurke:
 - meso i iznutrice: 0 dana.
- Telad koja doje i svinje:
 - meso i iznutrice: 7 dana.
- Kunići:
 - meso i iznutrice: 5 dana.
- Koke nosilje:
 - jaja za ljudsku ishranu: 0 dana.

NAČIN IZDAVANJA:

Izdaje se na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati u tamnoj, suhoj i prozračenoj prostoriji.

ROK UPOTREBE

Rok trajanja veterinarskog lijeka 24 mjeseca.

Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 30 dana.

Nakon rastvaranje u vodi rok trajanja je 24 sata.

PAKOVANJE

- 1 l
- 5 l

UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-766/16 J.B.; 24.06.2016.

PROIZVOĐAČ: **Filozoo Srl**; Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)

Tel: +39059637311