

FLORVIL
Ānjekciona Otopina
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

Florvil Ānjekciona Otopina, blago Źute boje, prozirna, spremna za upotrebu, sterilna Ānjekciona otopina u 1 ml sadrŹava 300 mg florfenikola.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Florvil Ānjekciona Otopina, je antibiotik širokog spektra, sentetiĉki bakteriostatik. Inhibira sintezu proteina tako Źto se vezuje za podjedinice bakterijskih 50 S ribozoma.

Glavne osjetljive bakterije su:

Gram pozitivne bakterije: *Actinomyces* sp., *Corynebacterium* sp., *Erysipelothrix rhusiopathie*, *Listeria monocytogenes*, veći dio *Staphylococcus* sp. i *Streptococcus* sp.

Gram negativne bakterije: *Actinobacillus* sp., *Bordetella bronchiseptica*, *Enterobacteraceae* (*E.coli*, *Klebsiella* sp., *Proteus* sp., *Salmonella* sp.), *Haemophilus* sp., *Leptospira* sp., *Moraxella* sp., *Pasteurella* sp..

Obiĉno svi anaerobi su osjetljivi. Ima umjeren uticaj na *Rhodococcus equi*. Ali , *Mycobacterium* sp. i *Nocardia* sp. su otporne.

Nakon intramuskularnog tretiranja brzo se apsorbira i 60 sati nakon tretiranja postigne serumsku koncentraciju 0.19 $\mu\text{g/ml}$. Stopa proteinskog vezivanja se mijenja između 12,7-18,3 %. Rasprostrani se uglavnom po ĉitavom tijelu ukljuĉujući pluća, jetru i bubrege. Izluĉuje se iz tijela putem urina i izmeta.

PODRUĀJE UPOTREBE / INDIKACIJE

Florvil Ānjekciona otopina, koristi se u lijeĉenju goveda i svija od bolesti uzrokovanih sa Flofenikol osjetljivim bakterijama, i to: infekcije dišnog trakta, uzrokovanog sa *Mannchemia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Corynebacterium pyogenes*, zatim pododermatitisa izazvanih sa *Fusobacterium necrophorum*, te nekrobaciloze sa *Bacteroides spp.* i keratokonjunktivisa sa *Moraxiela bovis*.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne preporuĉuje se tretiranje nikom osim doktoru veterinarske medicine;

Intramuskularno tretiranje :

Kod goveda , tretira se intramuskularno , na 15 kg Źive vage 1 ml (20 mg/kg florfenikola). Doza se ponavlja nakon 48 sati. Kod svinja također se tretira intramuskularno 10 mg / kg Źive vage. Praktiĉna doza je 1ml/20 kg Źive vage.

PotkoŹna primjena :

Kod goveda, tretira se potkoŹno , na 15 kg Źive vage 2 ml (40 mg/kg florfenikola). Za subkutanu primjenu jedna doza je dovoljna.

Ne tretirati viŹe od 10 ml, po potrebi doza bi trebala biti podijeljena.

Ānjekcije treba primjenjivati samo na podruĉju vrata.

U tretiranju primjenjivati asepsu i antisepsu.

NEŹELJENI EFEKTI

Nakon tretiranja lijekom moŹe biti smanjena potroŹnja vode i hrane.

Znaĉi, moŹe se primijetiti da je kod Źivotinja za vrijeme lijeĉenja smanjen apetit. Međutim, nakon Źto tretman zavrŹi apetit se vraća u normalu u veoma kratkom vremenu. Veoma rijetko se mogu pojaviti lokalne reakcije na mjestu uboda.

O svim neŹeljenim efektima koji nisu naznaĉeni u ovom Uputstvu potrebno je odmah obavjestiti nadleŹnog veterinaru u skladu sa ĉlanom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju uveterinarstvu ("SluŹbene novine Federacije BiH" broj 15/98 i 70/08

INTERAKCIJE LIJEKOVA

Lijek je nespojiv sa : fenitoinom, dikumarolom, talbutamidom, fenobarbitonom i pentobarbitalom.

UPOZORENJA O OSTATKU LIJEKOVA U HRANI

Karenca ; Meso i organi goveda kod intramuskularnog tretiranja - za vrijeme tretiranja i od zadnje teapije 30 dana , kod podkožnog tretiranja 44 dana.

Ne koristiti kod krava čije mlijeko se upotrebljava za ljudsku ishranu.

Meso i organi svinja - 18 dana.

KONTRAINDIKACIJE

Upotreba u gestaciji: Iako nije zabilježen uticaj na gestaciju i reprodukciju ipak se ne preporučuje tretiranje mladih goveda i goveda u gestaciji.

OPĆE NAPOMENE

Prije upotrebe, u slučaju neočekivanih uticajnih faktora kontaktirajte veterinara.

Čuvajte podalje od djece.

Ako otopina s vremenom požuti ,ne uzrokuje gubitak aktinosti.

SIMPTOMI PREDOZIRANJA , MJERE I OPREZI

Terapijski indeks je širok. U 10-15 puta većim dozama smanjeje potrošnaj hrane i vode kao i gubitak tjelesne mase, te se može pojaviti teški proljev i dehidracija. Ova tablica se brzo poboljšava sa prestankom primjene lijeka.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Ako lijek dođe u dodir sa očima ili kožom dobro isperite vodom.

Izbjegavajte kontakt sa lijekom te nakon tretiranja dobro isperite vodom.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Čuvajte na sobnoj temperaturi (15-25°C)

Nakon prve upotrebe čuvajte u kartonskoj kutiji te iskoristite u roku od 28 dana.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ili OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03):

BROJ I DATUM RJESENJA

UP-I-06-2-24/17-57/19 J.B; od 20.03.2019.godine

NACIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Upakovano u bezbojne bočice / prezentirane u kartonskoj kutiji od po 20, 50, 100 i 250 ml.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Koy İci Kümeevleri No: 765A, Akyurt / ANKARA / TURKEY

UVOZNIK i ZASTUPNIK ZA BiH

„Terravet" doo Gradacac, Sarajevska bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina