

FOLLIGON

Liofilizat za injekcionu otopinu, 5 x 1.000 i.j. serumskog gonadotrofina
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International B.V.
Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Folligon

Liofilizat u injekcijsku otopinu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Po ampuli liofiliziranog praška za injekciju:
Gonadotropin, konjski serum (PMSG) 1000 i.j.
Otapalo za rekonstituciju

INDIKACIJE:

Folligon 1000/PMSG 1000 je veterinarsko-medicinski proizvod koji sadrži 1000 i.j. gonadotropina (PMSG) u obliku liofiliziranog praška, koji se isporučuje sa rekonstitucionim otapalom. PMSG je moćan gonadotropin, sa dvostrukim FSH i LH djelovanjem. Stimuliše rast folikula i sazrijevanje folikula u danima koji prethode estrusu i ovulaciji.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Ciljne vrste	Indikacija	Doza Folligona (izražena u ij PMSG)	Napomena
Goveda (krave i junice)	Sinhronizacija ovulacije (subestrus, anestrus)	300-800	IM; na kraju tretmana progestagenom. Životinje van ciklusa trebaju primiti više doze
	Superovulacija	1500-3000	IM; po mogućnosti između 8. i 13. dana ciklusa ili pri kraju tretmana za sinhronizaciju baziranog na progestogenu
Ovce	Sinhronizacija ovulacije (subestrus, anestrus)	400-750	IM; na kraju tretmana progestagenom. Primijenjene doze treba prilagoditi sezoni (više doze treba dati ovcama van ciklusa u odnosu na ovce u ciklusu)
Koze	Sinhronizacija ovulacije (subestrus, anestrus)	400-750	IM; na kraju tretmana progestagenom. Primijenjene doze treba prilagoditi sezoni (više doze treba dati kozama van ciklusa u odnosu na koze u ciklusu)
Košute	Optimizacija plodnosti	200	Košuta (vrsta - obični jelen) IM; na kraju tretmana progestagenom
		50	Košuta (vrsta - Jelen lopatar) IM; na kraju tretmana progestagenom
Kuničke	Induciranje receptivnosti i optimizacija reproduktivnih rezultata	30-40	IM ili SC prvorotke
		8-25	IM ili SC višerotke

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i kod svih preparata koji sadrže protein, u rijetkim slučajevima se nedugo nakon primjene mogu javiti reakcije anafilaktičkog tipa. U takvim okolnostima može biti indicirano brzo davanje adrenalina ili glukokortikosteroida.

Prilikom davanja injekcije treba koristiti aseptične mjere predostrožnosti.

Ako primjetite bilo kakve druge nuspojave, kontaktirajte veterinara.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

CILJNE VRSTE

Goveda, koze, ovce, košute i kuničke.

KARENCA

„0“ dana“

Meso i mlijeko tretiranih životinja upotrebljivi su za prehranu ljudi bez ograničenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati u hladnjaku (+2°C do +8°C).

Nakon rekonstitucije, proizvod se može čuvati na 2 do 8 °C ne duže od 24 sata.

Čuvati van dohvata i pogleda djece.

POSEBNA UPOZORENJA

Primjenom Folligona u količinama iznad preporučenih može se povećati pojava dvojki kod goveda, pojava trojki kod ovaca i smanjiti plodnost kod nazimica. Ponovljena primjena PMSG kod koza može dovesti do proizvodnje PMSG antitijela u malom broju ženki, koja će nakon toga ometati efikasnost liječenja.

Ne koristiti kod gravidnih životinja.

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama:

PMSG je prirodni hormon koje ne djeluje oralno zato što veliki glikoproteini kao što je PMSG, ne prolaze kroz crijevni zid. Apsorpcija putem kože je malo vjerovatna. U slučaju nehoteičnog prolijevanja po koži, kožu treba odmah oprati sapunom i vodom.

Budući da samoubrizgavanje PMSG može uticati na funkciju polnih žlijezda, treba obratiti pažnju da ne dođe do samoubrizgavanja. Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah tražiti pomoć ljekara i pokazati letak iz pakovanja ili naljepnicu.

Proizvod može izazvati blagu iritaciju kože. Izbjegavali kontakt sa kožom. Nakon kontakta sa kožom odmah obilno isprati vodom. Nakon upotrebe oprati ruke.

Zbog rizika od slučajnog samoubrizgavanja, proizvodom ne smiju rukovati trudnice, žene koje planiraju da zatrudne ili žene koje nisu sigurne u svoj status trudnoće.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod ako ste preosjetljivi na gonadotropin.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17- 2152/19 J.B; od 18. 02. 2020. godine

PAKOVANJE: Bočica od 5x1.000 i.j. + solvent (5 bočica).

ROK UPOTREBE: veterinarsko-medicinskog proizvoda zapakovanog za prodaju: 36 mjeseci a nakon rekonstituisanja: 24 sata.

NAČIN IZDAVANJA: Na veterinarski recept.

ATCvet kod: QG03GA99

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat 35; 5831 AN Boxmeer; Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina