

1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA FARMA d.o.o., Džemala Bijedića 125 A, 71 000 Sarajevo

2. IME LIJEKA

Floron peroralna otopina 100 mg/ml
Florfenikol
Peroralna otopina
Živina (pilići), svinje

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml peroralne otopine sadrži:

Aktivna supstanca

Florfenikol 100 mg

Pomoćne supstance:

polietilenglikol.

4. INDIKACIJE

Živina: koli-infekcije, pasterelozne infekcije, zarazna koriza, stafilokokne infekcije, infekcije prouzrokovane bakterijom *Ornitobacterium rhinotracheale* i ostale bolesti čiji su uzročnici bakterije osjetljive na florfenikol.

Svinje: pleuropneumonija (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), atrofični rinitis (*Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*), Glässerova bolest (*Haemophilus parasuis*) i druge bolesti čiji su uzročnici bakterije osjetljive na florfenikol.

5. KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije. Takođe, ukoliko postoje podaci o predhodno ispoljenoj preosetljivosti, takve životinje ne treba tretirati ovim lijekom. Kontraidikovana je primjena ovog lijeka kod kokošaka.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Živina: Nisu poznata.

Svinje: Posle davanja lijeka ponekad se mogu javiti crvenilo perianalne regije i razmekšani feces. Ove promjene su prolazne, kratkotrajne i ne utiču na opšte stanje životinja.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Živina (pilići), svinje

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Živina: Dnevna doza iznosi 20 mg florfenikola po kilogramu tjelesne mase, što odgovara količini od 100 ml lijeka na 100 litara vode za piće za piliće do 4. nedelje života. Za kategorije poslije 4. nedelje života treba koristiti koncentraciju od 200 ml na 100 litara vode za piće. Liječenje traje 3 do 5 dana.

Svinje: Dnevna doza iznosi od 1,5 do 2 mg florfenikola po kilogramu telesne mase, što znači da dnevna doza lijeka za svinju težine od 100 kg iznosi od 1,5 do 2 ml. Liječenje traje 7 dana.

Živini i svinjama lijek treba davati u vodi za piće.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA

Nema.

10. KARENCA

Meso i iznutrice: živina: 2 dana.

Meso i iznutrice: svinje: 1 dan.

Lijek se ne smije davati nosiljama konzumnih jaja.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primjenu na životinjama.

Ovaj lijek se ne smije mješati sa drugim lijekovima.

Živina: Do sada nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Svinje: Posle davanja doze 10 puta veće od preporučene javljali su se blaga diareja i manje hemoragije iz mezenterijalnih krvnih sudova.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lijek životinjama

U toku lečenja životinjama ne treba davati drugu vodu za piće osim one koja sadrži lijek. Kada to nije moguće, dnevnu dozu treba davati podjeljenu u dvije jednake doze, jednu kao jutarnju dozu, a drugu poslije 12 sati.

13. POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Neiskorišćen lijek ili ostatak lijeka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

april, 2013.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica od 100 ml otopine i plastična boca od 1000 ml sa mjericom.

Način izdavanja: Izdaje se samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj dozvole: UP-I-06-2-24/17-912-1/13 od 06.06.2013. godina