

FRONTLINE® Spray

Antiektoparazitik
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml otopine sadržava: 2,5 mg fipronila

DJELOVANJE

Fipronil je kontaktni inekticid/akaricid iz grupe fenilpirazola. Mechanizam djelovanja mu je specifičan, a ogleda se u inhibiciji transmisije u organizmu osjetljivih insekata i arthropoda tako što blokira djelovanje inhibitornog neurotransmitora gama-aminobuterne kiseline (GABA-e). Kod insekata blokada je posljedica velikog afiniteta i vezivanja fipronila za kompleks GABA-ovinskih hloridnih kanala koji su vezani za specifne ligande. Oni su zastupljeni u nervnim ćelijama bezkičmenjaka, a rezultat ovog vezivanja je blokada pre i postsinaptičkog prolaza hloridnih jona kroz ćelijsku membranu. To uzrokuje hiperpolarizaciju membrane nervne ćelije, a nakon toga inhibiciju neurotransmisije, nekontrolisanu aktivnost centralnog nervnog sistema i na kraju insekata i akara. Osim toga specifičnog mehanizma djelovanja, fipronil ima još jedno važno svojstvo, tj. odlaže se u koži i naročito dlačnim folikulima, odakle se kontinuirano i postepeno oslobođava ponovo u kožu i dlačni prekrivač i tako ispoljava produženo djelovanje. Preliminarna istraživanja ukazuju da ima produženu aktivnost čak i nakon kupanja.

Fipronil ima znatno manji afinitet vezivanja za iste receptore (GABA-ovinske hloridne kanale) kod kičmenjaka u odnosu na bezkičmenjake i na tom se zasniva njegova selektivna toksičnost.

INDIKACIJE

FRONTLINE® Spray je indiciran za suzbijanje i kontrolu invazija:

- kod mačaka buhama (*Ctenocephalides felis*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*), paušima (*Felicola subrostratus*, *Neotropicula i Cheyletella*) i
- kod pasa za suzbijanje i kontrolu invazija buhama (*Ctenocephalides spp.*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor i Ixodes spp.*), paušima (*Trichodectes canis*) i ušima (*Linognathus setosus*).
- FRONTLINE® Spray se može koristiti i kod egzotičnih ptica i reptila.
- kao potprunu terapiju alergijskog dermatitisa kod mačaka i pasa uzrokovanih buhami.

APLIKACIJE I DOZE

FRONTLINE® Spray se primjenjuje kod pasa, mačaka, egzotičnih ptica i reptila. Kod pasa i mačaka topikalnim prskanjem kože i dlake cijelog tijela životinje s udaljenosti od 10-20 cm sve dok se krzno ne navlaži. Da bi se fipronil aplicirao prskanjem u dozi od 7,5 - 15 mg/kg tjelesne mase treba utrošiti, ovisno dužini i gustoći dlake psa ili mačke, 3-6 ml FRONTLINE® Spray. To znači da se mehanički dozimetar na spreju treba pritisnuti 2-4 puta, ako se koriste boćice s 250 ml, ili 6-12 puta, ako se koriste boćice sa 100ml pripravka.

Nakon primjene životinja je zaštićena od buha tokom 2 (1-3) mjeseca, od krpelja tokom 4 (3-5) sedmice, a od pauši od 42 dana (mačke) do 63 dana (psi).

Egzotične ptice: Aplikacije se izvodi prskanjem kože s udaljenosti 10-20 cm, što se po potrebi može ponoviti nakon 14 dana.

Reptili: Prskati s udaljenosti 10-20 cm svakih 7-10 dana.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindicirano ga je primjenjivati kod pasa i mačaka sa sistemskim i oboljenjima praćenim povиšenom temperaturom, kao i u fazi oporavka, kučića i mačića do 2 dana starosti, te kod kunića.



FRONTLINE® Spray

Antiektoparazitik
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml otopine sadržava: 2,5 mg fipronila

DJELOVANJE

Fipronil je kontaktni inekticid/akaricid iz grupe fenilpirazola. Mechanizam djelovanja mu je specifičan, a ogleda se u inhibiciji transmisije u organizmu osjetljivih insekata i arthropoda tako što blokira djelovanje inhibitornog neurotransmitora gama-aminobuterne kiseline (GABA-e). Kod insekata blokada je posljedica velikog afiniteta i vezivanja fipronila za kompleks GABA-ovinskih hloridnih kanala koji su vezani za specifne ligande. Oni su zastupljeni u nervnim ćelijama bezkičmenjaka, a rezultat ovog vezivanja je blokada pre i postsinaptičkog prolaza hloridnih jona kroz ćelijsku membranu. To uzrokuje hiperpolarizaciju membrane nervne ćelije, a nakon toga inhibiciju neurotransmisije, nekontrolisanu aktivnost centralnog nervnog sistema i na kraju insekata i akara. Osim toga specifičnog mehanizma djelovanja, fipronil ima još jedno važno svojstvo, tj. odlaže se u koži i naročito dlačnim folikulima, odakle se kontinuirano i postepeno oslobođava ponovo u kožu i dlačni prekrivač i tako ispoljava produženo djelovanje. Preliminarna istraživanja ukazuju da ima produženu aktivnost čak i nakon kupanja.

Fipronil ima znatno manji afinitet vezivanja za iste receptore (GABA-ovinske hloridne kanale) kod kičmenjaka u odnosu na bezkičmenjake i na tom se zasniva njegova selektivna toksičnost.

INDIKACIJE

FRONTLINE® Spray je indiciran za suzbijanje i kontrolu invazija:

- kod mačaka buhama (*Ctenocephalides felis*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*), paušima (*Felicola subrostratus*, *Neotropicula i Cheyletella*) i
- kod pasa za suzbijanje i kontrolu invazija buhama (*Ctenocephalides spp.*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor i Ixodes spp.*), paušima (*Trichodectes canis*) i ušima (*Linognathus setosus*).
- FRONTLINE® Spray se može koristiti i kod egzotičnih ptica i reptila.
- kao potprunu terapiju alergijskog dermatitisa kod mačaka i pasa uzrokovanih buhami.

APLIKACIJE I DOZE

FRONTLINE® Spray se primjenjuje kod pasa, mačaka, egzotičnih ptica i reptila. Kod pasa i mačaka topikalnim prskanjem kože i dlake cijelog tijela životinje s udaljenosti od 10-20 cm sve dok se krzno ne navlaži. Da bi se fipronil aplicirao prskanjem u dozi od 7,5 - 15 mg/kg tjelesne mase treba utrošiti, ovisno dužini i gustoći dlake psa ili mačke, 3-6 ml FRONTLINE® Spray. To znači da se mehanički dozimetar na spreju treba pritisnuti 2-4 puta, ako se koriste boćice s 250 ml, ili 6-12 puta, ako se koriste boćice sa 100ml pripravka.

Nakon primjene životinja je zaštićena od buha tokom 2 (1-3) mjeseca, od krpelja tokom 4 (3-5) sedmice, a od pauši od 42 dana (mačke) do 63 dana (psi).

Egzotične ptice: Aplikacije se izvodi prskanjem kože s udaljenosti 10-20 cm, što se po potrebi može ponoviti nakon 14 dana.

Reptili: Prskati s udaljenosti 10-20 cm svakih 7-10 dana.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindicirano ga je primjenjivati kod pasa i mačaka sa sistemskim i oboljenjima praćenim povиšenom temperaturom, kao i u fazi oporavka, kučića i mačića do 2 dana starosti, te kod kunića.



FRONTLINE® Spray

Antiektoparazitik
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml otopine sadržava: 2,5 mg fipronila

DJELOVANJE

Fipronil je kontaktni inekticid/akaricid iz grupe fenilpirazola.

Mehanizam djelovanja mu je specifičan, a ogleda se u inhibiciji transmisije u organizmu osjetljivih insekata i arthropoda tako što blokira djelovanje inhibitornog neurotransmitora gama-aminobuterne kiseline (GABA-e). Kod insekata blokada je posljedica velikog afiniteta i vezivanja fipronila za kompleks GABA-ovinskih hloridnih kanala koji su vezani za specifne ligande. Oni su zastupljeni u nervnim ćelijama bezkičmenjaka, a rezultat ovog vezivanja je blokada pre i postsinaptičkog prolaza hloridnih jona kroz ćelijsku membranu. To uzrokuje hiperpolarizaciju membrane nervne ćelije, a nakon toga inhibiciju neurotransmisije, nekontrolisanu aktivnost centralnog nervnog sistema i na kraju insekata i akara. Osim toga specifičnog mehanizma djelovanja, fipronil ima još jedno važno svojstvo, tj. odlaže se u koži i naročito dlačnim folikulima, odakle se kontinuirano i postepeno oslobođava ponovo u kožu i dlačni prekrivač i tako ispoljava produženo djelovanje. Preliminarna istraživanja ukazuju da ima produženu aktivnost čak i nakon kupanja.

Fipronil ima znatno manji afinitet vezivanja za iste receptore (GABA-ovinske hloridne kanale) kod kičmenjaka u odnosu na bezkičmenjake i na tom se zasniva njegova selektivna toksičnost.

INDIKACIJE

FRONTLINE® Spray je indiciran za suzbijanje i kontrolu invazija:

- kod mačaka buhama (*Ctenocephalides felis*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*), paušima (*Felicola subrostratus*, *Neotropicula i Cheyletella*) i
- kod pasa za suzbijanje i kontrolu invazija buhama (*Ctenocephalides spp.*), krpeljima (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor i Ixodes spp.*), paušima (*Trichodectes canis*) i ušima (*Linognathus setosus*).
- FRONTLINE® Spray se može koristiti i kod egzotičnih ptica i reptila.
- kao potprunu terapiju alergijskog dermatitisa kod mačaka i pasa uzrokovanih buhami.

APLIKACIJE I DOZE

FRONTLINE® Spray se primjenjuje kod pasa, mačaka, egzotičnih ptica i reptila. Kod pasa i mačaka topikalnim prskanjem kože i dlake cijelog tijela životinje s udaljenosti od 10-20 cm sve dok se krzno ne navlaži. Da bi se fipronil aplicirao prskanjem u dozi od 7,5 - 15 mg/kg tjelesne mase treba utrošiti, ovisno dužini i gustoći dlake psa ili mačke, 3-6 ml FRONTLINE® Spray. To znači da se mehanički dozimetar na spreju treba pritisnuti 2-4 puta, ako se koriste boćice s 250 ml, ili 6-12 puta, ako se koriste boćice sa 100ml pripravka.

Nakon primjene životinja je zaštićena od buha tokom 2 (1-3) mjeseca, od krpelja tokom 4 (3-5) sedmice, a od pauši od 42 dana (mačke) do 63 dana (psi).

Egzotične ptice: Aplikacije se izvodi prskanjem kože s udaljenosti 10-20 cm, što se po potrebi može ponoviti nakon 14 dana.

Reptili: Prskati s udaljenosti 10-20 cm svakih 7-10 dana.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindicirano ga je primjenjivati kod pasa i mačaka sa sistemskim i oboljenjima praćenim povиšenom temperaturom, kao i u fazi oporavka, kučića i mačića do 2 dana starosti, te kod kunića.



NUSPOJAVE

Kod incidentnih situacija, kada psi i mačke polžu aplicirani pripravak, javlja se pojačana salivacija, kao znak trovanja, a u ekstremnim slučajevima može se pojaviti kutana reakcija u vidu prolaznog eritrema, pruritusa ili alopecije.

NAPOMENA

Pripravak FRONTLINE® Spray se ne smije udisati, pa se mora primjenjivati samo u otvorenim i zračnim prostorijama. U kontaktu sa služnicama, iste iritira i zato ne smije dospijeti u oči, nos i usta. Rukovaci lijem trebaju prije rukovanja poduzeti mjere zaštite prirodnih otvora tretiranih životinja i mјere samozaštite (Moraju nositi masku, rukavice i odjelo). Prilikom tretmana životinja ne smiju jesti, pitи, a ni pušiti. Pošto je lijek zapaljiv, ne smije biti izložen, kao ni tretirane životinje sve dok se ne osuše, otvorenom plamenu, jakom izvoru topote i sl. Nakon tretmana ruke oprati vodom i sapunom.

S obzirom da se fipronil i njegovi metaboliti bioakumuliraju, naročito u ribama, te se ostaci ambalaže ne smiju bacati u vodotoke i ribnjake, nego ih treba odmah nakon upotrebe neškodljivo ukloniti s kućnim smećem. Ne preporučuje se kupanje ili šamponiranje 48 sati prije i poslije tretmana.

Nakon tretmana životinje treba izdvojiti i onemogućiti im da se same ili između sebe ližu. Najbolje ih je tretirati u predvečerje tako da ih vlasnici, naročito djeca, dok se ne osuše nikako ne diraju, maze ili s njima spavaju.

KARENCIJA

Nije propisana pošto se radi o pripravku koji se primjenjuje samo kod mačaka i pasa, životinja koja nije za ljudsku ishranu.

ČUVANJE

Lijek se čuva u kutiji na suhom, prozračnom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 30°C i izvan dohvata djece.

ROK UPOTREBE

Označen je na pakovanju.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje bez recepta.

PAKOVANJE:

Plastične sprej boce sa 100 i 250 ml otopine.

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-24/17 – 1220/15 J.B., od 24.11.2015

PROIZVODAČ

MERIAL, Lyon – Francuska

ZASTUPNIK

ARNIKA VETERINA SA d.o.o., Sarajevo
Ismeta Alajbegovića Šerbe 7, 71000 Sarajevo

NUSPOJAVE

Kod incidentnih situacija, kada psi i mačke polžu aplicirani pripravak, javlja se pojačana salivacija, kao znak trovanja, a u ekstremnim slučajevima može se pojaviti kutana reakcija u vidu prolaznog eritrema, pruritusa ili alopecije.

NAPOMENA

Pripravak FRONTLINE® Spray se ne smije udisati, pa se mora primjenjivati samo u otvorenim i zračnim prostorijama. U kontaktu sa služnicama, iste iritira i zato ne smije dospijeti u oči, nos i usta. Rukovaci lijem trebaju prije rukovanja poduzeti mjere zaštite prirodnih otvora tretiranih životinja i mјere samozaštite (Moraju nositi masku, rukavice i odjelo). Prilikom tretmana životinja ne smiju jesti, pitи, a ni pušiti. Pošto je lijek zapaljiv, ne smije biti izložen, kao ni tretirane životinje sve dok se ne osuše, otvorenom plamenu, jakom izvoru topote i sl. Nakon tretmana ruke oprati vodom i sapunom.

S obzirom da se fipronil i njegovi metaboliti bioakumuliraju, naročito u ribama, te se ostaci ambalaže ne smiju bacati u vodotoke i ribnjake, nego ih treba odmah nakon upotrebe neškodljivo ukloniti s kućnim smećem. Ne preporučuje se kupanje ili šamponiranje 48 sati prije i poslije tretmana.

Nakon tretmana životinje treba izdvojiti i onemogućiti im da se same ili između sebe ližu. Najbolje ih je tretirati u predvečerje tako da ih vlasnici, naročito djeca, dok se ne osuše nikako ne diraju, maze ili s njima spavaju.

KARENCIJA

Nije propisana pošto se radi o pripravku koji se primjenjuje samo kod mačaka i pasa, životinja koja nije za ljudsku ishranu.

ČUVANJE

Lijek se čuva u kutiji na suhom, prozračnom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 30°C i izvan dohvata djece.

ROK UPOTREBE

Označen je na pakovanju.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje bez recepta.

PAKOVANJE:

Plastične sprej boce sa 100 i 250 ml otopine.

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-24/17 – 1220/15, od 24.11.2015

PROIZVODAČ

MERIAL, Lyon – Francuska

ZASTUPNIK

ARNIKA VETERINA SA d.o.o., Sarajevo
Ismeta Alabegovića Šerbe 7, 71000 Sarajevo

NUSPOJAVE

Kod incidentnih situacija, kada psi i mačke polžu aplicirani pripravak, javlja se pojačana salivacija, kao znak trovanja, a u ekstremnim slučajevima može se pojaviti kutana reakcija u vidu prolaznog eritrema, pruritusa ili alopecije.

NAPOMENA

Pripravak FRONTLINE® Spray se ne smije udisati, pa se mora primjenjivati samo u otvorenim i zračnim prostorijama. U kontaktu sa služnicama, iste iritira i zato ne smije dospijeti u oči, nos i usta. Rukovaci lijem trebaju prije rukovanja poduzeti mjere zaštite prirodnih otvora tretiranih životinja i mјere samozaštite (Moraju nositi masku, rukavice i odjelo). Prilikom tretmana životinja ne smiju jesti, pitи, a ni pušiti. Pošto je lijek zapaljiv, ne smije biti izložen, kao ni tretirane životinje sve dok se ne osuše, otvorenom plamenu, jakom izvoru topote i sl. Nakon tretmana ruke oprati vodom i sapunom.

S obzirom da se fipronil i njegovi metaboliti bioakumuliraju, naročito u ribama, te se ostaci ambalaže ne smiju bacati u vodotoke i ribnjake, nego ih treba odmah nakon upotrebe neškodljivo ukloniti s kućnim smećem. Ne preporučuje se kupanje ili šamponiranje 48 sati prije i poslije tretmana.

Nakon tretmana životinje treba izdvojiti i onemogućiti im da se same ili između sebe ližu. Najbolje ih je tretirati u predvečerje tako da ih vlasnici, naročito djeca, dok se ne osuše nikako ne diraju, maze ili s njima spavaju.

KARENCIJA

Nije propisana pošto se radi o pripravku koji se primjenjuje samo kod mačaka i pasa, životinja koja nije za ljudsku ishranu.

ČUVANJE

Lijek se čuva u kutiji na suhom, prozračnom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 30°C i izvan dohvata djece.

ROK UPOTREBE

Označen je na pakovanju.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje bez recepta.

PAKOVANJE:

Plastične sprej boce sa 100 i 250 ml otopine.

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-24/17 -12207/15, od 24.11.2015

PROIZVODAČ

MERIAL, Lyon – Francuska

ZASTUPNIK

ARNIKA VETERINA SA d.o.o., Sarajevo
Ismeta Alabegovića Šerbe 7, 71000 Sarajevo