

FUVICIN[®]

kombinirani kemoterapeutik, vitamini, minerali
za upotrebu u veterinarstvu

Sastav

100 g praška sadržava:

oksitetraciklin klorid	3 g
sulfamonometoksin natrij	1,5 g
vitamin A u obliku retinil palmitata	200.000 i.j.
kolekalciferol (vitamin D ₃)	20.000 i.j.
tokoferil acetat (vitamin E acetat)	0,5 g
tiamin klorid (vitamin B ₁)	0,15 g
vitamin B ₂ (u obliku riboflavin natrij fosfata)	0,06 g
piridoksin klorid (vitamin B ₆)	0,05 g
cijanokobalamin (vitamin B ₁₂)	0,18 mg
nikotinamid	0,8 g
kalcij (d) pantotemat	0,65 g
natrij askorbat	337 mg
DL metionin	2,4 g
menadion natrij bisulfit (vitamin K ₃)	0,2 mg
natrij sulfat bezvodni	6 g
željezo sulfat 7 hidrat	25 mg
mangan sulfat 1 hidrat	20 mg
cink sulfat 7 hidrat	5 mg
bakar sulfat 5 hidrat	2 mg
kobalt klorid 6 hidrat	0,8 mg

Djelovanje

Kombinacija oksitetraciklina i sulfamonometoksina djeluje protiv mnogih gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, uzročnika primarnih i sekundarnih infekcija u domaćih životinja. Oksitetraciklin, kao antibiotik širokog spektra, djeluje i protiv spiroheta, aktinomiceta, rikecija, velikih virusa i nekih protozoa. Sulfamonometoksin je sulfonamid s prolongiranim djelovanjem.

Vitamini i minerali u međusobno pravilnom odnosu održavaju životne funkcije normalnim. Jačajući biotonus utječu veoma pozitivno na pojačanu otpornost životinja prema bolesti, uvjetuju pravilan rast i razvoj te utječu na produktivnost životinja.

Indikacije

Telad, sisančad, nazimad: terapija gastrointestinalnih bolesti; suzbijanje smrtnosti u najranijoj životnoj dobi.

Perad: profilaksa i terapija bolesti koje uzrokuju bakterije; preventiva sekundarnih infekcija u toku i nakon virusnih bolesti.

Kontraindikacije

Lijek se ne smije davati životinjama s oštećenom funkcijom jetre i bubrega. kao i životinjama osjetljivim na sulfonamide.

Nuspojave

Nisu primijećene.

Doziranje i način primjene

Telad: dvaput dnevno po 20 g praška

Sisančad: dvaput dnevno po 20 g praška za 10 životinja

Nazimad: dvaput dnevno po 20 g za 2—4 životinje

Perad: 100 g praška dnevno za 400—500 pilića (do uzrasta od 3 sedmice)

za 200—350 pilića (do 2 mjeseca)

za 140 kokica ili 130 nosilja

Lijek se daje u vodi za piće tokom 3—5 dana. Svakodnevno treba pripremiti svježu otopinu, koja mora biti jedini izvor tekućine za piće.

Profilaktične doze su za sve životinje upola manje od terapijskih.

Karencija

Meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i peradi i jaja nisu prikladni za ljudsku ishranu tokom davanja i 14 dana nakon zadnje aplikacije lijeka.

Meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja nisu prikladni za ljudsku ishranu tokom davanja i 14 dana nakon zadnje aplikacije lijeka.

Napomena

Lijek se ne smije davati s mlijekom, jer kalcij iz mlijeka može helirati s oksitetraciklinom i tako smanjiti njegovu biopotrebljivost.

Ostatak lijeka i ambalaža se ne smije nekontrolisano odlagati.

Način izdavanja

Na recept.

Način čuvanja

Lijek mora biti zaštićen od svjetlosti i vlage. Čuvati na temperaturi do 25°C, izvan dohvata djece.

Rok upotrebe

Označen je na pakovanju (2 godine).

Broj i datum rješenja

UP-I-06-2-24/17-216/13 od 04.02.2013. godine

Pakovanje

Plastične kutije od 100 g praška, vrećice od 100 g i 1 kg praška

Proizvođač

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenija

Zastupnik

KRKA FARMA d.o.o.

Džemala Bijedića 125 A

71 000 Sarajevo