

## GANADEXIL ENROFLOXACINA

Za upotrebu u veterinarstvu

### Sastav 1 ml:

Enrofloksacin 100 mg  
Benzil alkohol (E1519) 7.5 mg

**Indikacije:** Tretman kolibaciloze i infekcija uzrokovanih *Mycoplasma spp.*  
Korištenje fluorokinolona bi trebalo biti bazirano na testu osjetljivosti - antibiogramu.

**Kontraindikacije:** Ne koristiti za profilaksu.

Ne propisivati u slučaju poznate rezistentnosti/ukrštene rezistencije na druge fluorokvinolone.

Ne koristiti u slučaju hiperosjetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

### Neželjene reakcije:

Nisu poznate.

Ukoliko primjetite bilo koji od ozbiljnih uticaja ili drugih efekata koji nisu primjećeni u ovom uputstvu/naljepnici informišite veterinara.

**Ciljne vrste životinja:** Perad (brojleri)

### Doziranje i način primjene:

Oralnim putem u vodi za piće.

Perad (brojleri): Opšta doza je 0.10 ml Ganadexil Enrofloxacina po kg tjelesne mase (10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase) što se postiže aplikacijom 0.5 litara Ganadexil Enrofloxacina

(50 ppm enrofloksacina) na 1000 litara vode za piće svaki dan, uzastopno 3 dana.

Svjež rastvor praviti svaka 24 sata.

### Karenca:

Perad (brojleri) : Meso i iznutrice: 4 dana

Ne davati nosiljama za proizvodnju konzumnih jaja.

Ne davati zamjenskim nesilicama unutar 14 dana od očekivanog nešenja jaja.

### Posebna upozorenja za čuvanje lijeka:

Čuvati van domašaja djece.

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30 °C.

Rok trajanja nakon prvog otvaranja : 3 mjeseca

Rok upotrebe nakon rekonstitucije prema uputama: 24 sata.

### Posebna upozorenja:

Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu:

Liječenje infekcija *Mycoplasma spp.* vjerovatno neće iskorjeniti mikroorganizam.

Posebna upozorenja za upotrebu na životinjama:

Zvanične i lokalne antimikrobne smjernice bi trebale biti uzete u obzir pri korištenju proizvoda.

Fluorokinolone bi trebali da se čuvaju za tretman kliničkih stanja koja imaju spori odgovor na druge klase antimikroba.

Kada god je moguće, korištenje fluorokinolona bi trebalo biti bazirano na testu osjetljivosti - antibiogramu.

Korištenje proizvoda na način koji odstupa od instrukcija datih u uputstvu pakovanja može povećati prevalencije bakterija rezistentnih na fluorokinolone i može smanjiti efikasnost liječenja drugim kinolonima zbog mogućnosti unakrsne rezistencije.

Posebne mjere opreza za osobe koje rukuju sa veterinarsko medicinskim proizvodom:

Osobe sa poznatom hipersenzitivnošću na fluorokinolone ili na bilo koji od pomoćnih tvari trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarskim proizvodom.

Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Kod slučajnog kontakta isprati područje mlazom vode.

Ukoliko se nakon izlaganja jave simptomi, kao što su kožne erupcije trebalo bi konsultovati doktora i pokazati ovo upozorenje. Inflamacija lica, usana ili očiju ili respiratorne poteškoće su neki od znakova da treba da potražite hitnu lječničku pomoć.

Ne pušiti, jesti ili piti dok se rukuje sa proizvodom.

Korištenje tokom gravidnosti, laktacije i leženja:

Ne koristiti kod koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku upotrebu.

Ne davati zamjenskim nesilicama unutar 14 dana od očekivanog nešenja jaja.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima ili druge forme interakcija:

In vitro, antagonizam se primjećuje kada se kombinuju fluorokinoloni sa bakteriostatčkim antimikrobnim agensima kao što su makrolidi ili tetraciklini i fenikoli.

Istovremena aplikacija supstanciji koje sadrže aluminijum ili magnezijum mogu pogoršati apsorpciju enrofloksacina.

Predoziranje ( simptomi, hitne procedure, antidoti)

U slučaju predoziranja može se javiti slaba stimulacija spontane pokretljivosti pri čemu tretman treba prekinuti. Intoksikacija sa fluorokinolonima može uzrokovati mučnina, povraćanje i dijareju.

Korištenje fluorokinolona tokom faze rasta kombinovano sa izrazitim i povećanim uzimanjem vode za piće, te time i aktivnog sastojka, usljed povećane temperature može biti potencijalno povezano sa oštećenjem zglobne hrskavice.

Inkompatibilnost:

Ne miješati sa jakim kiselim supstancama.

**Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja lijeka:**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

**Pakovanje:** 1 litar, 5 litara

**Način izdavanja:** Izdaje se na veterinarski recept.

**Broj i datum odobrenja:** UP-I-06-2-24/17 – 922/17 J.B., od 01. oktobra 2017. godine

**Proizvođač:** Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat, Barcelona Spanija

**Uvoznik i distributer za BiH:** Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica  
tel: 032/423-196, fax: 032/423-194