

GALAPAN

Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: D-Cloprostenol (sodium) 75µg; ekscipijens q.s. 1ml

Indikacije za upotrebu:

Lijek Galapan je indiciran kod krava, krmaca i kobila za:

- indukciju estrusa – kod anestrusa
- indukciju porođaja kod krava, krmaca i kobila
- indukciju estrusa kod kobila- kod anestrusa
- disfunkciju jajnika u prisustvu žutog tijela, postporođajni anestrus, tihi estrus, neuredan ciklus i ciklus bez ovulacije , perzistencije žutog tijela, luteinske ciste;
- endometritis i piometra
- prekid graviditeta (tokom prve polovine) fetalne mumifikacije
- postpueperalna metropatija, odgođena uterina involucija
- kombinirana folikularna cistična terapija (10-14 dana nakon administracije GnRH ili HCG)

Kontraindikacije:

Izbjeci tretman gravidnih životinja ukoliko nije u namjeni izazivanja abortusa ili porođaja.

Specijalna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

Primjena Galapana nije preporučljiva kod kobila koje boluju od serijskih respiratornih i /ili gastrointestinalnih bolesti.

Neželjene reakcije:

Nisu uočene neželjene reakcije pri dozama 10 puta većim od terapijska doze za krave i krmace.

Kod kobila umjereno znojenje i meka stolica su otkrivene kada se aplicira trostruka terapijska doza.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i druge forme interakcije:

Ne koristiti kod životinja koje su pod tretmanom sa nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima, jer inhibiraju sintezu endogenih prostaglandina. Aktivnost drugih oksitocinskih agenasa može se povećati nakon primjene kloprostenola.

Ciljane vrste:

Goveda (krave), svinje (reproduktivne krmace) i konji (kobile koji nisu namjenjene ljudskoj upotrebi)

Doziranje i način primjene:

Galapan se administrira isključivo intramuskularno

Goveda (krave) : preporučene doze su 0.150mg D-cloprostenola ,ekvivalentno 2ml

-Indukcija estrusa (takođe kod krava sa slabim ili tihim estrusom)

dati proizvod nakon određivanja prisustva žutog tijela (6-8 dana ciklusa). Estrus se generalno uočava 40-60 sati. Inseminaciju izvršiti 72-96 sata nakon prethodnog tretmana.

-Indukcija porođaja: dati proizvod nakon 270-og dana gravidnosti. Porođaj bi se trebao desiti 30-60 sati nakon tretmana.

-Disfunkcija jajnika:

Kada se utvrdi prisustvo žutog tijela, dati proizvod i izvršiti inseminaciju u prvom estrusu nakon tretmana. Ako se neuoči estrus, uraditi drugi ginekološki pregled i ponoviti davanje 11 dana nakon prvog tretmana.

-Endometritis i piometra: administrirati 1 dozu proizvoda. Ponoviti tretman 10 dana poslije ukoliko je potrebno. Inseminirati 72-96 sata nakon tretmana.

-Prekid gravidnosti: administrirati proizvod tokom prve polovine graviditeta.

-Fetalna mumifikacija: administrirati 1 dozu proizvoda. Fetus će biti potisnut nakon 3 ili 4 dana.

-Postpueperalna metropatija- odgođena uterina involucija. Administrirati 1 dozu proizvoda i ukoliko je indicirano ponoviti tretman jednom ili dva puta u dozi od 1 ml (24 sata poslije).

-kombinirana terapija folikularnih cista: administrirati proizvod 10-14 dana nakon aplikacije GnRH ili HCG, nakon pozitivnog djelovanja na ovarij.

Konji (kobile koje nisu namjenjene ljudskoj upotrebi) preporučena doza 0.075mg D-Cloprostenol/ po životinji što je ekvivalentno 1ml/po životinji. Ponoviti ako je potrebno prema indikacijama.

-Indukcija estrusa: administracija proizvoda. Još bolje nakon utvrđivanja prisustva žutog tijela (determinacija progesterona).

-indukcija porođaja: produkt je administriran nakon 320 dana gravidnosti. Porođaj se najčešće dešava nakon nekoliko sati.

-Plan inseminacije : administrirati proizvod dva puta (sa intervalom od 14 dana) Inseminirati nakon 19 i 21 dana nakon prvog tretmana čak i u odsustvu vanjskih znakova estrusa.

-Prekid prolongiranog estrusa: administrirati proizvod za indukciju estrusa koji se javlja u intervalu 2 do 8 dana od tretmana ovulacije, u trajanju tretmana od 8-10 dana .

- Prekid lažnog graviditeta: administrirati proizvod u namjeni da se uspostavi normalna ovarijalna funkcija.

-anestrus tokom laktacije: administrirati proizvod 20-22 dana nakon porođaja , nakon uspostave ciklusne aktivnosti. Onda se obezbjeđuje estrus i ovulacija.

Rano fetalno uginuće: administrirati proizvod , najbolje nakon potvrde prisustva žutog tijela (dokaz progesterona) . Inseminirati na početku estrusa.

Svinje (reproduktivne krmače) preporučena doza je 0.075mg D-cloprostenola/životinji, što je ekvivalentno 1ml/životinji.

-indukcija porođaja: administrirati proizvod nakon 112 dana gravidnosti. U oko 70% slučajeva do poroda dolazi 19-30 sati nakon tretmana.

Predoziranje: Galapan se dobro podnosi u 10 puta većoj terapijskoj dozi kod krava i krmača. Kod kobilica, je primjećeno nakon administracije tri puta veće terapijske doze umjereno znojenje i pojava mekih fecesa .

Karenca:

Krave: meso-0 dana, mlijeko -0 sati

Krmače: meso-1 dan

Kobile: ne administrirati kobilama čije meso je namijenjeno za ljudsku upotrebu.

Posebna upozorenja za čuvanje:

Ne zahtjeva posebne mjere čuvanja. Rok trajanja nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana.

Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod životinjama:

Galapan može biti absorbovan kroz kožu i može uzrokovati bronhospazam i abortus, kao i svi F2 α prostaglandini. S proizvodom se mora rukovati oprezno da bi se izbjeglo slučajno samoinjiciranje ili kontakt sa kožom. Žene u reproduktivnim godinama , astmatične osobe i osobe sa bronhijalnim problemima ili drugim respiratornim problemima moraju izbjegavati kontakt ili koristiti plastične rukavice tokom procesa administracije. Kontaktirajte ljekara odmah ukoliko se dese respiratorni poremećaj usljed inhalacije ili inokulacije. U slučaju slučajnog kontakta sa kožom, isprati odmah sa vodom i sapunom.

Korištenje tokom gravidnosti i laktacije: korištenje kod gravidnih životinja može uzrokovati abortus.

Specijalna upozorenja za neupotrebene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljaju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način čuvanja: Držati izvan doseg djece

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: kutija sa jednom bočicom od 2ml, kutija sa jednom bočicom od 10ml, kutija sa jednom bočicom od 20ml, kutija sa 5 bočica od 20ml

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Spanija

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica

Broj rjesenja izdatog od FMPVS BiH: UP-I-06-2-24/17-1306/15 J.B. 19.11.2015.