

## **UPUTSTVO ZA PRIMJENU**

### **1. NAZIV LIJEKA**

Gentamicin 8 % injekcije  
za goveda, svinje, pse i mačke

### **2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

1 ml injekcione otopine sadrži:

Aktivna supstanca:

Gentamicin (u obliku gentamicin sulfata) 80,00 mg

Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), dinatrijev edetat, natrijev metabisulfit, voda za injekcije.

### **3. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

### **4. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, 71 000 Sarajevo

### **5. INDIKACIJE**

- Primarne i sekundarne, a posebno tvrdokorne infekcije gastro-intestinalnog, respiratornog i urogenitalnog sistema koje uzrokuju bakterije osjetljive na gentamicin.
- Bakterijemije, a posebno postnatalne septikemije.
- Bakterijske infekcije 'dubokih tkiva' (mišići, kosti, koštana moždina, zglobovi i dr.) i tjelesnih šupljina (peritonitis, pleuritis, cistitis, perikarditis i dr.).

### **6. KONTRAINDIKACIJE**

Gentamicin 8% ne smije se primjenjivati:

- gravidnim životinjama;
- jedinkama s oštećenom funkcijom bubrega
- životinjama za koje je utvrđeno da su preosjetljive na aminoglikozide

### **7. NUSPOJAVE**

Davanjem većih doza gentamicina može doći do oštećenja bubrega i organa sluha i ravnoteže, posebno u mačaka.

### **8. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA**

Goveda, svinje, psi i mačke.

### **9. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE**

Doza iznosi 4 mg gentamicina po kg tjelesne mase, dva puta dnevno.

Aplicira se intramuskularno, i to govedu 5 mL pripravka na 100 kg tjelesne mase svakih 12 sati, a za telad, svinje, prasad, pse i mačke od 0,4-0,5 ml na 10 kg tjelesne mase svakih 12 sati.

Liječenje traje 3 do 5 dana, tj. još 2 dana nakon što se povuku znakovi bolesti.

## **10. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA**

Različite soli (natrijeve, kalijeve, kalcijeve), karbamati, sulfati, kloridi, fosfati i nitrati, mogu znatno smanjiti djelovanje antibiotika gentamicina, zato se ne preporuča miješati pripravke gentamicina sa bilo kojim drugim pripravklom u brizgaljki.

## **11. KARENCIJA**

Meso i jestive iznutrice (osim bubrega):	28 dana
Bubrezi:	45 dana
Mlijeko:	3 dana

## **12. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati van dohvata djece.  
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.  
Pripravak se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe.  
Rok upotrebe poslije prvog otvaranja boćice je 28 dana.

## **13. POSEBNA UPOZORENJA**

Produžena primjena visokih doza može oštetiti kranijalni živac VII u mačaka.  
Dehidriranim životinjama je potrebno nadomjestiti izgubljenu tekućinu prije aplikacije.

Za primjenu na životinjama.

## **14. POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

Neiskorišten lijek ili ostatak lijeka se uništavaju u skladu sa važećim propisima (Sl. novine FBiH 33/03-Zakon o upravljanju otpadom).

## **15. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA**

23.07.2014. godine

## **16. OSTALI PODACI**

Broj dozvole za stavljanje u promet:  
UP-I-06-2-24/17-959/14 od 23.07.2014. godine

Način izdavanja: na recept  
Pakovanje: boćica od 100 ml  
Rok upotrebe: 5 godina.  
Pripravak se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe.  
Rok upotrebe poslije prvog otvaranja boćice je 28 dana.

ATCvet kod: QJ01GB03