

GEOMYCIN® F, 1 g, intrauterina tableta, za krave, kobile, krmače
Za upotrebu u veterinarstvu

IME LIJEKA

GEOMYCIN® F, 1 g, intrauterina tableta, za krave, kobile, krmače

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadržava:

Djelatna tvar:

Oksitetraciklin hidroklorid 1 g

Pomoćne tvari: kukuruzni škrob, vinska kiselina, natrijev hidrogenkarbonat, želatina, polioksietilen cetil-eter, magnezijev stearat, dietanolamid masne kiseline ulja kokosa, talk

DJELOVANJE

Oksitetraciklin (OTC) je antibiotik širokog antimikrobnog spektra. Osobito je učinkovit u liječenju puerperalnih infekcija. Koči rast i razmnožavanje velikog broja gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, a djeluje i protiv spiroheta, rikecija i nekih protozoa.

Geomycin® F tablete lako su topljive, a u dodiru sa sadržajem uterusa nastaje znatna količina pjene ugljičnog dioksida. Ugljični dioksid raspodjeljuje OTC po šupljini maternice, a također potiče njegov prodror u dublje slojeve sluznice gdje uvećava koncentraciju OTC-a. Osim toga, pjena ugljičnog dioksida mehanički čisti površinu endometrija, evakuira prisutne bakterije, tonizira miometrij i stimulira ga na kontrakcije.

INDIKACIJE

Sprječavanje i liječenje puerperalnih infekcija genitalnih organa krava, kobila i krmača uzrokovanih bakterijama osjetljivim prema OTC-u. Intrauterina primjena Geomycin® F tableta posebice je indicirana u slučajevima:

- zaostajanja posteljice;
- endometritisa;
- puerperalne piometre;
- uvrтанja i izvale maternice;
- pobačaja, teških poroda, povreda porodajnih putova;
- fetotomije;
- infekcije bakterijom *Campylobacter fetus*.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost životinja na sastojke tablete, a što je u praksi gotovo nepoznato.

Lijek se ne smije koristiti tokom graviditeta.

Lijek se ne smije koristiti sa drugim antibioticima intrauterino.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

Ako se primijete neželjeni efekti lijeka, veterinar je potrebno da obavijesti nadležne organe ili nosioca odobrenja dozvole za lijek.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, kobile, krmače.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Geomycin® F tableta stavlja se cijela u uterus.

Terapija: 1-2 tablete. Jednokratno.

U težim slučajevima liječenje se ponovi nakon 48 sati.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU PRIMJENU LIJEKA

Nema li u maternici tekućeg sadržaja ili ga je nedostatno tableta može lokalno dražiti. U takvim slučajevima treba, prije stavljanja tablete, sterilnim kateterom i.uter. infundirati 200-400 ml prokuhanе vode, čiste fiziološke otopine ili otopine fosfatnog pufera.

Ako je pak u maternici obilje tekućeg sadržaja, treba ga ukloniti prije stavljanja tablete Geomycin® F.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 10 dana.

Mlijeko: 4 dana.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Čuvati ispod 25 °C.

Zaštititi od svjetla.

Rok valjanosti označen je na opremi, u originalnoj ambalaži: 18 mjeseci.

Tabletu treba iskoristiti neposredno nakon otvaranja folije.

Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji i blisteru.

POSEBNA UPOZORENJA

Geomycin® F tabletu ne smije se životinjama dati p.o.

Mala tableta silikagela služi za navlačenje vlage i nije za uporabu.

Nužno je paziti da se prilikom intrauterine aplikacije tablete ne prouzroči dodatna infekcija. Zbog toga prije davanja treba toplom vodom i sapunom oprati ruke do ramena te vanjske dijelove i okolinu spolnih organa životinje. Savjetuje se upotrijebiti čiste porodiljske rukavice prilikom aplikacije ovog lijeka.

Nakon davanja tableta ruke treba oprati čistom vodom.

Geomycin® F tableta ne primjenjuje se tijekom graviditeta.

Ne postoje kontraindikacije za upotrebu u razdoblju laktacije.

Istovremeno s Geomycin® F tabletom, intrauterino se ne smije stavljati druge lijekove. Ako je potrebno usporedo sustavno davati antibiotike, oni se moraju u učinku nadopunjavati s oksitetraciklinom.

Zbog osobitosti načina primjene tableta (intrauterino) opasnost od predoziranja je minimalna, kao i posljedična pojava štetnih sustavnih učinaka.

Sigurnost za okoliš:

Nema opasnosti ako se lijek koristi u skladu s uputom.

**POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG LIJEKA
ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA**

Bilo koji neupotrijebljeni lijek ili otpadni materijali dobiveni primjenom tog lijeka treba se odlagati u skladu s *Zakonom o upravljanju otpadom* („Službene novine Federacije BiH „, 33/03).

BROJ I DATUM RJEŠENJA: UP-I-06-2-24/17-1363/17 J.B, od 15. 11. 2017. godine

NAČIN IZDAVANJA

Na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Kutija sa 10 tableta/pesarija.

ATCvet kôd: QG51AA01

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Genera d.d.

Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Hrvatska

NAZIV I ADRESA NOSIOCA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genera d.o.o.

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina