

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
AMPROLIUM 25% LIQUIDO TREI 250mg/g
oralna solucija za brojlerske piliće i kokoši nesilice
Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: 1 g proizvoda sadrži:

Aktivnu supstancu

Amprolium (kao hidrochlorid) 250 mg

Pomoćne supstance:

Natrijum metill-p-hidroksibenzoate, natrijum propil-p-hidroksibenzoate
ostali

1 g

Farmaceutski oblik: oralna solucija

Ciljane vrste: brojlerski pilići i kokoši nesilice

Indikacije: Liječenje kokcidioze kod brojlerskih pilića i kokoši nesilica.

Kontraindikacije: Ne koristiti u slučajevima hipersenzitivnosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih tvari. Lijek se ne smije upotrebljavati u kombinaciji sa tiaminom (vitamin B1), zbog mogućnosti smanjenja efikasnosti amproliuma. Lijek se ne koristi u periodu vakcinacije pilića putem vode za piće. Lijek se ne upotrebljava u kombinaciji sa drugim antikokcijskim preparatima. Životinje se ne smiju tretirati sa drugim antibioticima ili kokcidiostaticima u toku terapije sa ovim preparatom. Obratiti pažnju na dezinfekciju pojilica ili objekta, ili prisustvo hlora u vodi za piće, koji se mora primjetiti na ispravan način, po uputstvu proizvođača.

Neželjene reakcije:

Nisu poznate. U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70 /08).

Doziranje, način primjene i metoda administracije:

Proizvod se mora dati rastvoren u vodi za piće u dozi koju je propisao veterinar na veterinarskom receptu, vodeći računa da se ne prekorači dozvoljena dnevna doza (izražena u mg/ kg tjelesne mase).

Terapija se kod brojlera može izvršiti najkasnije do 7 dana pred klanje

Brojlerski pilići: 2g lijeka na svaki litar vode za piće što je jednako 500gr aktivne supstance na litar vode za piće tokom 7 dana unutar tova.

Terapija se kod koka nesilica može izvršiti najkasnije do 16 sedmice života.

Kokoši nesilice: 0.24-1g lijeka na svaki litar vode za piće što je jednako 6.0-35 mg aktivne supstance na kg tjelesne mase tokom 7 dana

Ne mješati sa čvrstim hranivima.

Karenca:

Lijek se ne smije upotrebljavati u periodu od 7 dana pred klanje.

Brojlerski pilići: meso i iznutrice: 3 dana

Lijek se ne smije primjenjivati nakon 16 sedmice života kod koka nesilica.

Kokoši nesilice: jaja: 10 dana.

Specijalna upozorenja:

Ovaj veterinarski proizvod ne zahtjeva posebne uslove skladištenja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 15 dana

Rok upotrebe nakon rastvaranja ili rekonstitucije: 12 sati

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja:

Kao i kod svih antikocijskih lijekova dugotrajna upotreba može dovesti do selekcije otpornih vrsta.

Liječenje bi se trebalo zasnovati na rezultatima paraziotoloških pregleda fecesa. Ukoliko je rezistencija na amprolium evidentna iz rezultata ispitivanja trebalo bi upotrijebiti antikokcidijalne lijekove koji pripadaju drugoj farmakološkoj klasi i sa različitim mehanizmima djelovanja.
Kao i kod svih antikokcidijalne lijekove dugotrajna upotreba može izazvati selekciju rezistentnih vrsta.

Da bi se izbjeglo ili odgodilo nastupanje otpornosti, izbjegavati da se antikokcidijalni lijekovi nađu u vodi ili u hrani u koncentracijama većih od propisanih ili u dužem periodu od propisanog.

Kada je sadržaj tiamina (vitamin B1) u ishrani visok, moguće je da će doći do smanjenog djelovanja aktivnosti antikokcidijalnih lijekova. Također ako je amprolium prisutan u ljekovitoj vodi u visokim koncentracijama, odnosno u nepropisanim koncentracijama, kod domaćina može doći do nedostatka tiamina. Ne mješati sa čvrstom hranom.

Specijalna upozorenja koja trebaju preuzeti osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

Ako se proizvodom rukuje u skladu sa uobičajenim postupcima pripreme i davanja (zaštitna odjeća i obuća), nisu potrebne posebne mjere za onoga koji rukuje. Međutim, dobra praksa je da se izbjegava gutanje i kontakt sa kožom i očima. Ne jesti, piti ili pušiti tokom rukovanja. U slučaju kontaminacije dobro isprati sa vodom i sapunom. U slučaju gutanja potražite ljekarsku pomoć i pokažite najjepnici ili uputstvo proizvoda.

Korištenje tokom gravidnosti, laktacije i nesenja:

Proizvod se može koristiti tokom nesenja.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije:

Ne primjenjivati u kombinaciji sa vitaminom B1.

Da bi se izbjegla ubrzana degradacija amproliuma u pikriknu kiselinu tokom terapije ne koristiti hranu sa visokim sadržajem holina.

Izbjegavati primjenu u vodi bogatoj sa Ca ++ jonima.

Predoziranje:

Visoke doze mogu izazvati polineuritis, koji se može liječiti tiaminom. Nesmiju se davati više doze od propisanih.

Inkompatibilnost:

U odsustvu studije kompatibilnosti ne bi trebalo mješati proizvod sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodom.

Specijalna upozorenja za čuvanje:

Držati van dosega dijece.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen zakonski propisanom procedurom, odnosno, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja: na veterinarski recept.

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-1212/18 J.B., od 16. oktobra 2018. godine

Pakovanje: boca 1kg, kanister 5kg, 10kg.

Proizvođač: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. , Viale Corassori 62, Modena, Italija
a LIVISTO company

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Gorazdanska 36a 72000 Zenica; tel: 032/423-196; fax: 032/423-194; e-mail: bosnavet@bih.net.ba