

**Prijedlog Uputstva za upotrebu**

**NOBILIS IB Multi + ND + EDS, bočica od 500 ml za 1000 doza**

**(za primjenu na peradi)**

Proizvođač: Intervet International BV

Adresa: Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

Podnosilac zahteva: Intervet International predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## 1. IME LIJEKA

Nobilis IB Multi + ND + EDS

## 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstance po dozi od 0.5 ml:

IBV soj M41	koji inducira	$\geq 4.0 \log_2$	VN jedinica
IBV soj 249G:	koji inducira	$\geq 4.0 \log_2$	VN jedinica
EDSV soj BC14:	koji inducira	$\geq 6.5 \log_2$	HI units
NDV soj Klon 30:	koji inducira	$\geq 4.0 \log_2$	HI jedinica po 1/50. doze
	ili sadrži	$\geq 50$	PD50 jedinica

Adjuvans: meki tečni parafin 215 mg/dozi.

## 3. DJELOVANJE

Nobilis IBmulti +ND + EDS je inaktivirana vakcina koja sadrži dva soja virusa infektivnog bronhitisa (Massachusetts serotip i (M41) i varijantu (249G) koja pripada serotipu D274/D207), soj virusa Njukastlske bolesti i soj virusa sindroma pada nosivosti. Antigeni su inaktivirani formalinom i suspendovani u vodenoj vazi emulzije adjuvansa voda u ulju.

Antigeni su inkorporisani u emulziju voda u ulju kako bi se pojačala produžena stimulacija imuniteta.

## 4. INDIKACIJE

Vakcina se preporučuje za vakcinaciju nosilica i rasplodnih jata za zaštitu od virusa infektivnog bronhitisa (serotipova Massachusetts i D 274/D207) i virusa Njukastlske bolesti, kao i sindroma pada nosivosti.

## 5. KONTRAINDIKACIJE

Nisu zabilježene.

## 6. CILJNE VRSTE

Nesilice i rasplodne kokoši.

## 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Svakoj ptici treba dati 0.5 ml vakcine intramuskularnim putem u bedreni ili prsni mišić ili supkutano u donji dio vrata.

Nobilis +IBmulti+ND+EDS treba davati pticama starosti 14-20 sedmica, ali ne ranije od 4 sedmice prije očekivanog pronošenja.

Za optimalni dodatni efekat, ptice treba pripremiti tako što će se prethodno vakcinisati sa živom vakcinom protiv infektivnog bronhitisa i Njukastlske bolesti. Priprema živom vakcinom protiv sindroma pada nosivosti nije neophodna. Najbolji rezultati će se ostvariti ako se vakcinacija sa inaktiviranom vakcinom obavi barem 4 sedmice nakon aplikacije žive vakcine.

## 8. NAPOMENA

- ✓ Prije upotrebe, dopustiti da vakcina dosegne sobnu temperaturu (15 °C -25 °C).
- ✓ Bočicu dobro protresti prije upotrebe i nekoliko puta tokom upotrebe.
- ✓ Prije upotrebe provjeriti da je pribor za vakcinaciju čist i sterilan.
- ✓ Ne koristiti pribor za vakcinaciju koji sadrži gumene dijelove jer ekscipijensi mogu oštetiti određene vrste gume.

## **9. KARENCA**

„0“ dana.

## **10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Otklanjanje otpada nastalog primjenom vakcine ili vakcine sa isteklim rokom vrši se u skladu s odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## **11. NAČIN ČUVANJA**

Čuvati na temperaturi između +2 °C i +8 °C. Štititi od izvora svjetlosti. Ne zamrzavati.

12. **ROK TRAJANJA:** 24 mjeseca. Jednom otvoren spremnik mora se upotrijebiti unutar 3 sata.

13. **PAKOVANJE:** bočica od 500 ml za 1000 doza

13 **NAČIN IZDAVANJA:** Na veterinarski recept.

**ATCvet kod:** QI01AA13

## **14. BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17-1797/17 J.B; od 11. septembra 2018. godine

## **15. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

## **16. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Intervet International bv predstavništvo za BiH, Tešanjka 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.