

INVEMOX 15% LA
injekciona suspenzija produženog djelovanja
Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav:

1 ml suspenzije sadrži: Amoxicillin (trihydrate) 150 mg

Indikacije:

Lijek je namjenjen za liječenje infekcija uzrokovanim osjetljivim mikroorganizmima lociranim u digestivnom, respiratornom i urogenitalnom traktu, koži i mekim tkivima, kao i kod bolesti koje sekundarno kompliciraju bakterije osjetljive na amoksicilin.

Kontraindikacije:

Ne davati životinjama koje su osjetljive na penicilin ili na bilo koju pomoćnu tvar.
Ne koristiti kod konja, kunića, zamoraca i hrčaka imajući na umu da amoxicilin kao i svi aminopenicilini, imaju snažan uticaj na cecalne bakterije.

Neželjena dejstva:

Različite reakcije osjetljivosti se ogledaju od proste urtikarije do anafilaksije.
Lokalna reakcija na mjestu aplikacije.
Gastrointestinalni poremećaji (povraćanje, diareja i povremeno kolitis)
Supra infekcije uzrokovane neosjetljivim mikroorganizmima nakon dugotrajne terapije.
Mogu se javiti povremene promjene kao što su krvni poremećaji i kolitis.
Ukoliko primjetite neke od ozbiljnijih efekata koji nisu spomenuti u ovom uputstvu, molimo informišite nadležnog veterinaru.

Ciljane vrste životinja:

Goveda, ovce, svinje, psi i mačke

Doziranje i način primjene:

Intramuskularno i subkutano.

1ml Invemox 15% L.A. na 10 kg tjelesne mase (ekvivalent 15mg amoxicillin/kg tj.mase) u pojedinačnoj dozi. Ukoliko je potrebno administracija se može ponoviti nakon 48 sati.

Da bi se osiguralo ispravno doziranje tjelesna težina bi se trebala odrediti što tačnije da bi se izbjeglo predoziranje.

Karenca:

Meso goveda, ovaca i svinja: 14 dana

Mlijekogoveda i ovaca: 48 sati (4 muže)

Uputstvo za pravilnu primjenu lijeka:

Dobro promućkati bočicu prije upotrebe.

Upotrebjavati suvi i sterilni pribor.

Ne administrirati u istu ubodnu stranu više od 20 ml kod goveda, 5 ml kod svinja, 5 ml kod ovaca. Različite mjesta za aplikaciju bi se trebale koristiti za svaku administraciju.

Nakon tretiranja nježno masirati mjesto aplikacije.

Predožiranje :

Predožiranje je rijetko. U slučaju alergijskih reakcija, tretman bi se trebao nastaviti uz korištenje kortikosterida i adrenalina. U ostalim slučajevima koristiti simptomatski tretman.

Posebna upozorenja za čuvanje lijeka:

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperature ispod 30°C.

Lijek iskoristiti 28 dana nakon prvog otvaranja.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja otisnutog na naljepnici ili pakovanju.

Posebna upozorenja:Posebna upozorenja za upotrebu na životinjama

Kod svakog infektivnog procesa preporučuje se bakteriološka konfirmacija dijagnoze i sprovođenje testa osjetljivosti na bakterije koje uzrokuju proces.

Ne davati lijek intravenski.

Posebna mjere opreza za osobe koje daju veterinarski lijek životinjama

U slučaju samoubrizgavanja odmah zatražite ljekarski savjet i ljekaru pokažite letak iz pakovanja.

Osobe sa poznatom preosjetljivošću na peniciline trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarskim medicinskim proizvodom.

Oprezno rukovati sa proizvodom. Pri rukovanju sa proizvodom nositi zaštitne rukavice.

Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Uslijed slučajne ekspozicije, isprati povrijeđeno mjesto sa vodom. Ne pušiti, jesti i piti u toku rukovanja proizvodom

Korištenje tokom graviditeta, laktacije i leženja:

U studijama rađenim na laboratorijskim životinjama nije bilo dokaza o teratogenim i fetotoksičnim učincima ili učincima štetnim po trudnoću.

Sigurnost proizvoda nije ustanovljena tokom gravidnosti i laktacije. Koristiti samo na osnovu procjene koristi/rizika nadležnog veterinara.

Predoziranje(simptomi, hitne procedure, protuotrovi):

Predoziranje je rijetko. U slučaju alergijskih reakcija, tretman bi trebalo prekinuti i dati kortikoide i adrenalin. U ostalim slučajevima provesti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost:

U odsustvu studije kompatibilnosti ovaj veterinarski proizvod se ne bi trebao mješati sa drugim veterinarskim lijekovima.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Lijekove ne treba odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Ove mjere su u svrhu pomoći zaštite okoliša.

Pakovanje: bočica 100 ml i 250 ml

Način izdavanja: Izdaje se na veterinarski recept.

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-921/17 J.B, od 01. novembra 2017. godine

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Spanija

Uvoznik i distributer za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica
tel: 032/423-196, fax: 032/423-194

