

Kafevil
Înjekcionala Otopina
Veterinarski Analeptik
Za upotrebu u veterinarstvu

KAFEVÎL Injekciona otopina, je bezbojna ili svijetlo žuta čista otopina , 1 ml sadrži 250 mg kofeina .

FARMAKOLOSKA SVOJSTVA : KAFEVÎL injekciona otopina, koja sadrži kofein ksantin je derivat alkaloida. Kofein je vrlo učinkovit CNS stimulans . U početku , zbog stimulacije središnjeg sustava usporuje rad srca , nakon toga stimuliše srčani mišić te nakon kratkog vremena redovito će ubrzati rad srca . Dakle , povećava snagu srca i povećava puls . , Krvni tlak raste , jer se srce i krvne žile šire zbog bolje hrane. Potiče skeletne mišićne kontrakcije i povećava moć naprezanja (doping) . Kafevil , AMP blokira aktivnost fosfodiesteraze te učinkovito djeluje na produljenja poluživota nukleotida u stanicama . Kafevil se proširi po čitavom tijelu i ima skoro 100 % djelovanje na mjestu primjene . U roku od 48 sati 80 do 85% se izlučuje putem urina.

KORIŠTENJE/INDIKACIJE: Lijek djeluje na periferni nervni sistem, prvenstveno za stimulaciju disanja kod svih vrsta domaćih životinja. Zatim, pri febrilnim stanjima, za poboljšanje rada srca, stimulaciju disajnog sistema, kod bolesti bubrega, uzrokovanih bolešću srca, puerperalne pareze, potrebe za povećanjem aktivnosti skeletnih mišića i kao potporna terapija.

DOZIRANJE I PRIMJENA:

Ne preporučuje se tretiranje nikom osim doktoru veterinarske medicine; Kafevil injekciona otopina ,daje se u jednoj dozi,subkutano.

Farmakološka doza: 5-15 mg / kg tjelesne težine.

Praktična doza:

Konj i goveda :2-6 ml/100 kg žive vase.

Ovce / koze : 1-3 ml/50 kg žive vase.

Psi i mačke: 0,1 - 0,3 ml / 5 kg tjelesne težine.

KONTRAINDIKACIJE:

Nisu zabilježene.

POSEBNE KLINIČKE INFORMACIJE I POSEBNE MJERE OPREZA ZA CILJANE VRSTE

Kod Trkačih konja 10 dana prije utrke treba prekinuti doziranje zbog dopinga.

NEŽELENI EFEKTI :

Zbog perifernog proširenja krvnih sudova može izazvati pad krvnog pritiska. Zbog povećanja potrošnje kisika kod životinja može doći do povećanja tjelesne temperature,znojenja,drhtanja te do povećanja tonusa mišića.
O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu potrebno je odmah obavjestiti nadležnog veterinara u skladu sa članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/98 i 70/08)

INTERAKCIJE LIJEKOVA:

Ne postoji bilo kakve interakcije s drugim lijekovima. Mogu se koristiti zajedno.

UPOZORENJA O OSTATKU LIJEKOVA U HRANI :

Karenca: Goveda, ovce i koze za mljeko i meso "0" dana.

MJERE OPREZA, PREDOZIRANJE I SAVJETI ZA VETERINARA:

KAFEVIL, ima veliku dozu sigurnosti prilikom tretiranja. Međutim, velike doze mogu uzrokovati povremene i kontinuirane grčeve. Te posljedice mogu biti blokirane sa barbituratima. Kod pasa i mačaka parenteralnom primjenom u velikim dozama može uzrokovati smrtonosni učinak.

Upotreba u gestaciji: Preporučena upotreba u gestaciji.Nema nikakvih smetnji.

OPĆE NAPOMENE

Prije upotrebe, u slučaju neočekivanih uticajnih faktora kontaktirajte veterinara.

Čuvajte podalje od djece.

Ne prodavati u slučajevima isteknutog roka trajanja.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja, ako se čuva na sobnoj temperaturi tijekom 24 mjeseca od dana proizvodnje.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

KOMERCIJALNA PREZENTACIJA

Pakovano u jantarne staklene boce od : 20 ml, 50 ml ve 100 ml.

NAČIN IZDAVANJA

İzdaje se samo na veterinarski recept u apotekama i veterinarskim stanicama.

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-54/19 J.B; od 20. 03. 2019.godine

VLASNIK LICENCE I ADRESA PROIZVOĐAČA

Vilsan Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk Yolu 2.km, Yenice köyü mevkii, Esenboğa / ANKARA

Tel: 0312 827 18 40

UVOZNIK I ZASTUPNIK

"Terravet" d.o.o. Gradačac, Sarajevska bb, Gradačac

