

Uputstvo za upotrebu

Ketaminol 10

(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Proizvod Intervet International B.V.

Podnosilac zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Naziv lijeka

Ketaminol 10

- za upotrebu u veterinarstvu -

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Vodeni rastvor od 100 mg ketamin hidrohlorida po 1 ml.

Indikacije za upotrebu:

Preparat osigurava anesteziju i analgeziju ali utiče na mišićni tonus i ponekad izaziva nekoordiniranu mišićnu aktivnost. Sa ketaminom, respiracije su blago oslabljene dok je srčana frekvencija blago povećana. Zaštitni refleksi kao gutanje, kašljanje i kornealni refleks su očuvani.

Za hirurške zahvate KETAMINOL 10 bi se trebao koristiti zajedno sa mišićnim relaksantom. KETAMINOL 10 se može kombinirati sa svim neurolepticima i anestheticima (uključujući i inhalatorne anestetike). Kombinacija sa ksilazinom je preporučljiva zbog njegove jake pouzdanosti.

Nakon parenteralne primjene KETAMINOL-a 10 brza resorpcija i distribucija osiguravaju i brz, aktivan učinak. Anestezija ovim preparatom je kratkog djelovanja (10 min.), ali se lako može produžiti dodavanjem doze u kombinaciji sa drugim anestheticima.

Kontraindikacije

Ketamin može biti embriotoksičan. Lijek se ne smije koristiti na gravidnim životinjama.

U cilju sprečavanja prevelike količine pljuvačke, posebno kod pasa i svinja, savjetuje se primjena atropina (0.02 – 0.1 mg/kg TT).

Ciljana vrsta

Psi, mačke, konji, svinje, goveda, ovce, koze, glodari, hrčci, zečevi, ptice i divlje životinje.

Doziranje i način primjene

Konj	i.v.	0.02 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Svinja	i.v.	0.1 mL/kg t.mase	sam ili u kombinaciji
	i.m.	0.1-0.2 mL/kg t.mase	
Pas	i.v.	0.01-0.03 mL/kg t.mase	u kombinaciji
	i.m.	0.03-0.1 mL/kg t.mase	
Mačka	i.v.	0.05-0.1 mL/kg t.mase	sam
	i.m.	0.2-0.3 mL/kg t.mase	sam
	i.m.	0.1-0.2 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Zec, kunić	i.m.	0.35-0.7 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Zamorac, hrčak	i.m.	0.6-1 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Ptice (ovisno o vrsti)	-	0.15-0.4 mL/kg t.mase	-
Divlje životinje	i.m.	otopiti 125 mL ksilazina (prah) u 1 mL Ketaminola 10 (solucija Hellabrunn)	
Odrasla goveda	i.v.	0.02 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Telad	i.v.	0.02-0.1 mL/kg t.mase	u kombinaciji
Ovce, koze	i.v.	0.1-0.2 mL/kg t.mase	u kombinaciji
	i.m.	0.1-0.2 mL/kg t.mase	u kombinaciji

Uputa za pravilnu upotrebu lijeka

U ketaminskoj anesteziji, oči ostaju otvorene. Preporučuje se aplikacija oftalmičkog lubrikanta u sprečavanju sušenja kornee. Kod konja, svinja i pasa, sam ketamin dovodi do nekoordinirane mišićne aktivnosti. Savjetuje se primjena sa mišićnim relaksantom. Kod pasa i mačaka može doći do povraćanja, kada se ketamin kombinira sa ksilazinom. Stoga se životinje trebaju vezati prije anestezije.

Karenca

„0“ dana.

Lijek se ne primjenjuje kod gravidnih životinja.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Na tamnom mjestu, pri temperaturi do 25 C.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Uništava se u skladu s važećim propisima u BiH, Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Datum odobrenja teksta uputstva za korisnika

UP-I-06-2-24/17-749/18 J.B., od 10. septembra 2018. godine

Pakovanje: Bočice od 20 ml.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 36 mjeseci a nakon prve upotrebe, 8 sedmica.

ATC vet kod: QN01AX03.

Proizvođač: Intervet International B.V. Holandija

Podnosilac zahtjeva:

Predstavništvo Intervet International za BiH

Tešanjaska br 24, Sarajevo