

KETINK
Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: Ketoprofen 100mg; ekscipijensi 1ml

Indikacije i ciljani domaćini:

Goveda: antiinflamatori i analgetički tretman bolesti mišićnoskeletnog sistema i vimena.

Svinje: antiinflamatori i antipyretički tretman (Mastitis Metritis Agalactia) MMA sindroma i respiratornih bolesti.

Konji: antiinflamatori i analgetički tretman bolesti muskulature, zglobova i skeleta.

Simptomatsko analgetsko liječenje kolika. Postoperativni bol i oteknuća.

Kontraindikacije: Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili neko od pomoćnih sredstava. Ne koristiti kod životinja koje pate od gastrointestinalnih lezija, hemoragične diateze, krvne diskrazije, oštećenja jetre, srčanih ili bubrežnih funkcija.

Ne koristiti kod ždrijebadi u njihovim prvim mjesecima života. Ne koristiti druge nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIDs) istovremeno ili unutar 24 sata jedan od drugog.

Neželjene reakcije: Višestruko intramuskularno injektiranje može uzrokovati privremenu iritaciju. Usljed njegovog mehanizma djelovanja koji uključuje inhibiciju sinteze prostaglandina, ketoprofen može uzrokovati gastro i intestinalne iritacije ili uceracije. Višestruka administracija svinjama može rezultirati reverzibilnom inapetencom. Alergijska reakcija se dešava rijetko. Ukoliko se primjete bilo kakvi serijski efekti ili drugi efekti koji nisu spomenuti na uputstvu pakovanja molimo informirajte veterinarskog hirurga.

Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije :

Goveda: intramuskularna ili intravenozna primjena .

3mg katoprofena/kg tjelesne mase jednako je 3ml proizvoda /100 kg tjelesne mase.

Daje se jednom na dan tokom 3 dana.

Svinje: intramuskularna primjena.

3mg katoprofena/kg tjelesne mase jednako je 3ml proizvoda /100 kg tjelesne mase

Daje se jednokratno.

Konji: intravenozna primjena.

2.2mg katoprofena/kg tjelesne mase jednako je 1ml proizvoda/45kg tjelesne mase.

Daje se jednom dnevno tokom 3-5 dana.

U slučaju kolika, tretman ne bi trebao biti ponovljen dok se ne uradi ponovni klinički pregled.

Savjet za ispravnu administraciju: Ne aplicirati više od 5ml po jednom mjestu intramuskularnog ubrizgavanja. Gumeni čepovi ne smiju biti probušeni više od 166 puta.

Karenca: meso i iznutrice goveda, svinja i konja: 4 dana

Mlijeko krava: „0“ dana.

Nije namjenjeno za korištenje kod kobila koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

Specijalna upozorenja za čuvanje: držati bočicu unutar kartonskog pakovanja. Držati zaštićeno od sunca . Ne držati u frižideru niti zamrzavati . Ne koristiti ovaj veterinarski proizvod nakon isteka trajanja koji je naveden na naljepnici.

Rok iskoristivosti nakon prvog otvranja bocice : 28 dana

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za korištenje na životinjama: korištenje katoprofena nije preporučljivo kod ždrijebadi mlađih od 1 mjeseca. Korištenje kod životinja mlađim od 6 sedmica starosti ili starijim životinjama može izazvati dodatni rizik. Ukoliko korištenje ne može biti izbjegnuto na životinjama se može zahtjevati smanjenje doza i oprezan menadžment. Izbjegći intra-arterijsko injiciranje.

Ne prelaziti preporučene doze ili dužinu tretmana. Koristiti sa oprezom kod dehidriranih životinja i životinja sa niskim krvnim pritiskom. U slučaju kolika dodatna doza može biti davana nakon temeljnog kliničkog pregleda. Dovoljna količina vode za piće mora biti obezbjeđena tokom cijelog vremena trajanja tretmana.

Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

Voditi računa da se izbjegne slučajno samoinjiciranje. U slučaju slučajnog samoinjiciranja , zatražiti medicinsku pomoć i pokazati naljepnicu pakovanja ili pakovanje ljekaru. Osobe sa poznatom hiperosjetljivošću na ketoprofen ili benzil alkohol bi trebale izbjegavati kontakt sa veterinarsko medicinskim proizvodom. Izbjegći špricanje po koži i očima. Ukoliko do toga dođe isprati temeljno sa vodom . Ukoliko iritacija i dalje bude prisutna zatražiti savjet ljekara.

Oprati ruke nakon upotrebe.

Korištenje tokom graviditeta, laktacije i nosivosti: studije o efektu ketoprofena kod gravidnih laboratorijskih životinja i goveda nisu dale nikakve dokaze o sporednim efektima.

Kako sigurnost ketoprofena nije procjenjena kod gravidnih kobila i krmača , proizvod bi trebao biti korišten jedino sa procjenom dobiti/rizika procjenjenom od strane odgovornog veterinara.

Interakcije sa drugim proizvodima ili drugim formama interakcije:

Proizvod ne bi trebao biti administriran zajedno sa ili u roku 24 sata nakon administracije drugog (nesteroidnog protuupalnog lijeka) NSAIDs i glukokortikoida. Istovremena administracija dijuretika, nefrotoksičnih lijekova i antikoagulacionih lijekova treba biti izbjegнута.

Ketoprofen se visoko veže za plazma proteine, i može izmjestiti ili biti izmješten od strane drugog lijeka koji se veže za proteine kao što su antikoagulansi. Obzirom na činjenicu da ketoprofen može inhibirati sljepljivanje trombocite i uzrokovati slučaj gastrointestinalne ulceracije, nebi trebao biti korišten sa drugim proizvodima koji imaju isti profil ili slične reakcije lijeka.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidot)

Nije bilo zabilježenih kliničkih znakova kada je proizvod davan konjima 5 puta (11mg/kg) u dozi preporučenoj za 5 dana, govedima 5 puta (15mg/kg/dan) preporučenoj dozi za 5 dana ili svinjama 3 puta (9 mg/kg/dan) dozi preporučenoj 3 dana.

Ketoprofen može dovesti do preosjetljivosti ili može imati štetan efekt na želučanu sluznicu. Ovo može zahtjevati prestanak ketoprofen tretmana i uvođenje simptomatske terapije.

Nekompatibilnosti: u nedostatku studije o kompatibilnosti , ovaj veterinarsko medicinski proizvod ne smije biti mješan sa drugim veterinarskim proizvodom.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon uopravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način čuvanja: Držati izvan dosega djece

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: bočica od 100ml i 250ml

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Llobregat , Barcelona Španija

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica

Broj rješenja izdatog od FMPVS BiH: UP-I-06-2-24/17-1309/15 J.B. 19.11.2015.