

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Masticol®-DC

Intramamarna suspenzija

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 injektor (5 g) sadrži:

Ampicilina (u obliku ampicillin trihidrata): 250 mg

Kloksacilina (u obliku kloksacilin benzatina): 500 mg

OBLIK

Injekcijska otopina

INDIKACIJE

Primjenjuje se kod muznih krava u suhostaju, radi zastite od infekcija koje se javljaju u suhostaju i pri tretiranju mastitisa nakon posljednje muze tokom laktacije. Primjenjuje se za smanjenje pojave mastitisa u ljetnom period. Antibakterijsko dejstvo sa ovim lijekom može trajati oko 28 dana u mamarnom tkivu.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek je kontraindikativan za životinje osjetljive na penicilin.

NEZELJENI EFEKTi

Najznačajnije nuspojave penicilina su anafilaksia (povećana osjetljivost organizma) i kolaps. Ovih toga, može doći do manje ozbiljnih ali učestalijih reakcija poput preosjetljivosti (urtikarija, groznica, angioneurotski edem itd). U slučaju anafilakse treba primijeniti eninefrin i/ili kisik I intravenzno steroid.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu potrebno je odmah obavjestiti nadležnog veterinara u skladu sa članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/98 i 70/08)

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne preporučuje se osim po preporuci veterinara.

Sadržaj jedne tube se nanosi na svaki mamarni dio vimena preko mamarnog kanala nakon poslednjeg muzenja tokom perioda laktacije. Prije primjene lijeka potrebno je izmesti mlijeko iz mamarnog dijela vimena. Radi unistavanja zaraznih mikroorganizama potrebno je detaljno ciscenje bradavica i ruku. Potom se ukloni vrh kanile i pazljivo se umetne u mamarni otvor, ali se kanila ne treba gurati u mamarni kanal. Nakon praznjenja sadrzaja tube bradavice treba tretirati prstima i mamarni dio vimena njezno masirati dianom cime sadrzaja tube bradavice treba tretirati prstima i mamarni dio vimena njezno masirati dianom cime sadržaj lijeka zasigurno dopre do mamarnog tkiva. Nakon primjene lijeka potrebno je obrisati bradavice antiseptickim maramicama. Antibakterijsko dejstvo unutar mamarnog tkiva traje oko 28 dana nakon primjene lijeka.

KARENCIJA:

Meso, organi i ostala jestiva tkiva krava: 28 dana,

Mlijeko: 49 dana + 96 sati. Ukoliko se krava oteli prije 49-tog dana nakon primjene VMP, tada do koristenja mlijeka također treba proteći 56 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemicnih krava

ponekad je nuzno produžiti „vrijema cekanja“ upotrebe mlijeka na vise od 56 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se utvrdi da su rezidue antibiotika manji od najviše dopusenih koncentracija (kloksaciklin < 30 µg/kg ; ampicillin < 4 µg/kg).

UVJETI SKLADISTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 2 god od datuma proizvodnje.

Zastititi od svjetlosti.

Čuvajte na sobnoj temperaturi (15-25°C).

SIMPTOMI PREDIZIRANJA I MJERE OPREZA

U slučaju anafilakse nastale uslijed predoziranja ili osjetljivosti prekinuti upotrebu i ako je moguce primijeniti adrenalin, steroid i kisik prema klinickim uputama.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Osobe osjetljive na penicillin ni u kom slučaju ne smiju doci u kontakt sa lijekom. Izlaganje osjetljivih osoba prilikom kontakta lijeka sa usnom dupljom. Kozom ili prilikom udisaja uzrokuje oticanje lica, očiju ili usana i potiske kod disanja što zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju. U tom slučaju treba kontaktirati ljekara i pokazati istom lijek i prospect kojeg treba drzati kod sebe. Nakon primjene lijeka dobro oprati ruke.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ili OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03):

BROJ I DATUM RJESENJA

UP-I-06-2-24/17-51/19 J.B; od 20.03.2019.godine

NACIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Kutije sa 24 injektora i pojedinacna pakovanja injektora u kesicama (injektor = 5 g).

PROIZVODAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Koy lci Kümeevleri No: 765A, Akyurt / ANKARA / TURKEY

Tel: (+90 312) 827 18 40

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradacac, Sarajevska bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 035/819-523

