

Prijedlog uputstva za upotrebu

MASTIJET FORT
Intramamarna suspenzija
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač:	Intervet International B.V. Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija
Adresa:	
Podnosilac zahteva:	Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH
Adresa:	Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Mastijet Fort
Intramamarna suspenzija
za upotrebu u veterinarstvu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Injektor (uljna suspenzija) od 8 g sadržava 200,0 mg tetraciklin-hidrohlorida, 250,0 mg neomicina u obliku sulfata, 28,0 mg bacitracina, 10,0 mg prednizolona i do 8,0 g nosača.

INDIKACIJE

Intramamarna primjena kod krava u laktaciji za liječenje kliničkog mastitisa uzrokovnog osjetljivim mikroorganizmima (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp -S agalactiae*, *S. Ubris*, *S. Dysgalactiae*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Actinomyces pyogenes* – ljetni mastitis“).

KONTRAINDIKACIJE

Poznata alergija na tetraciklin, bacitracin, neomicin ili prednizolon je apsolutna kontraindikacija.

NEŽELJENA DEJSTVA

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

CILJNE VRSTE

Mliječne krave u laktaciji.

DOZIRANJE, METOD I NAČIN PRIMENE

Intramamarna primjena jedne šprice po zaraženoj četvrti vimena svakih 12 sati.
Maksimalni tretman iznosi četiri primjene. Prije upotrebe treba u potpunosti izmisti zaraženu četvrt. Djelomično ili potpuno skinuti poklopac sa kraja mlaznice brizgaljke, u zavisnosti od toga da li se vrši djelomično ili potpuno umetanje. Pažljivo umetnuti mlaznicu u otvor sise. Polako istisnite cijeli sadržaj brizgaljke u sisu.

KARENCA

Meso i iznutrice krava : 64 dana.
Mlijeko: 15 muža (7,5 dana ukoliko su muže svakih 12 sati).

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na temperaturi koja ne prelazi 25°C.

Nakon otvaranja vrećice: iskoristiti preostale šprice okom 48 sati.

POSEBNA UPOZORENJA

Proizvod se dobro podnosi kada se primjenjuje intramamarno u preporučenim dozama.

Posebne mjere predostrožnosti za upotrebu kod životinja:

Ovaj proizvod je namijenjen za upotrebu tokom laktacije i može se koristiti tokom gravidnosti. Nepravilna upotreba proizvoda može povećati učestalost bakterija otpornih na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski lijek životinjama:

Lica alergična na tetraciklin, neomicin ili bacitracin trebaju izbjegavati kontakt proizvoda sa kožom. Tetraciklin, neomicin ili bacitracin mogu izazvati preosjetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Alergijske reakcije na navedene tvari mogu povremeno biti ozbiljne. Ako se nakon izlaganja pojave simptomi, kao što je osip kože, trebate tražiti pomoć doktora i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom gravidnosti i laktacije:

Mastijet Fort je namijenjen za upotrebu tokom laktacije i tokom gravidnosti. Istraživanja na laboratorijskim životinjama nisu proizvela dokaze embriotoksičnih i/ili teratogenih efekata.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-2160/19 J.B.; od 18. Ofebruara 2020. godine.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija s 20 injektora od 8 g i 20 maramica za brisanje.

Rok upotrebe: Lijeka zapakovanog za prodaju: 15 mjeseci.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

ATCvet kod: QJ51RV01

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V.; Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH; Tešanjaska 24 A, Sarajevo