



Meflosyl 5%

Otopina za injekcije

SASTAV

Svaki 1mL injekcijske solucije sadrži:

Aktivna supstanca:

Fluniksin	50mg
-----------	------

Pomoće supstance:

Fenol	5mg
Natrium formaldefid sulfoksilat dihidrat	3,3 mg
Dinatrium edetat dihidrat	0,1mg

DJELOVANJE

Fluniksin meglumin je jaki, ne steroidni analgetik, sredstvo sa protuupalnom, antipiretskom i anti-endotoksičnom aktivnošću.

Fluniksin meglumin je potentni inhibitor ciklo-oksiogenaze, a time i za endogenu proizvodnju prostaglandina. Pokazalo se da fluniksin ima anti-endotoksičnu aktivnost, naročito protiv učinaka endotoksina E. coli.

Studije na konja su pokazale da se početak djelovanja javlja u roku od 2 sata (= 15 do 60 minuta), nakon parenteralne primjene, kada se koristi kod mišićno-koštanih poremećaja.

Najviši odgovor se javlja između 12-16 sati, a djelovanje je 24-36 sati (30-40 sati).

Kada se koristi za kolike kod konja, studije su pokazale ublažavanje bola za 15 minuta (intravenozno).

Poluživot u plazmi seruma kod konja je 1,6 sati nakon jedne doze od 1,1 mg / kg. Mjerljive količine su prepoznatljiv u konjskoj plazmi u osam sati nakon injekcije.

Fluniksin se uglavnom izlučuje putem žuči, manjim dijelom preko urina.

INDIKACIJE

Konji:

Indikovan je za ublažavanje upale i bolova kod mišićno-koštanih poremećaja, kao i za ublažavanje viscerarnog bola kod količnih grčeva.

Goveda:

Indikovan je za kontrolu akutne upale kod respiratornih bolesti, pomaže kod emfizema pluća kao i potporna terapija u liječenju akutnog mastitisa.

Svinje:

Indikovan kao potporna terapija u liječenju respiratornih oboljenja svinja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne prekoračivati preporučenu dozu ili trajanje tretmana.

Ne primenjivati kod gravidnih kobila.

Ne primenjivati kod životinja koje pokazuju preosjetljivost na fluniksin.

Ne koristiti kod životinja koje imaju srčane, bubrežne ili poremećaje u radu jetre, pošto postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja.

OBLIK

Injekcijska solucija

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Indikovan je za intravensko davanje kod konja i goveda

Konji:

Preporučena doza kod koštanih i mišićnih poremećaja je 1,1mg fluniksina na kg tjelesne mase što je ekvivalentno 1ml na 45 kg telesne mase jednom dnevno u toku 5 dana u zavisnosti od kliničkog odgovora.

Za upotrebu kod kolika preporučena doza je 1,1mg fluniksina na kg telesne mase što je ekvivalentno 1ml na 45 kg telesne mase. Daje se jednom ili dva puta ukoliko se kolika ponavlja.

Za liječenje endotoksemije ili šoka uzrokovanih torzijom želuca ili ishemije gastrointestinalnog trakta preporučena doza je 0,25mg fluniksina na kg tjelesne mase što je ekvivalentno 1ml na 200 kg tjelesne mase u toku 6-8 sati.

Goveda:

Preporučena doza je je 2,2mg/kg telesne mase što je ekvivalentno 2ml na 45 kg tjelesne mase jednom dnevno u toku 5 dana.

Svinje:

2ml na 45 kg tjelesne mase ekvivalentno 2.2mg fluniksina/kg jedanput,intramuskularno u vrat,u kombinaciji sa antimikrobnom terapijom.

Treba koristiti dobro izbaždaren spric zbog malih količina koje treba precizno da se doziraju. Na jedno injekcione mjesto ne davati više od 5 ml

NUSPOJAVE

Flunixin meglumin je nesteroidni anti inflamatorni lijek, te neželjene reakcije uključuju iritaciju gastro intestinalnog sistema, ulceracije, dehidraciju i hipovolemiju kod životinja,što predstavlja opasnost za rad bubrega.

NAPOMENA

Za primjenu na životinjama

Kod trkačkih konja nije dozvoljena upotreba ne steroidnih antinflamatornih lijekova ili ih ukinuti najmanje 8 dana prije trke.

Siguran je kod gravidnih goveda i svinja. Ne koristiti kod gravidnih kobila. Izbjegavati direktn kontakt sa kožom i očima. Treba nositi rukavice prilikom davanja lijeka. U slučaju akcidentalnog kontakta sa očima, isprati ih velikom količinom vode i zatražiti pomoć ljekara. Kod poznate preosjetljivosti na preparat, izbjegavati svaki kontakt sa njim, jer posljedice mogu biti ozbiljne. Izbegavati akcidentalno samoubrizgavanje.

KARENCA

Konji: Meso i jestivi organi 7 dana

Goveda: Meso i jestivi organi 5 dana; Mlijeko 36 sati

Svinje: Meso i jestivi organi 22 dana

NAČIN ČUVANJA

Na tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25 °C) i izvan dosega djece.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Rok upotrebe je otisnut na ambalaži i traje 3 godine

Kada se otvorí, lijek je potrebno potrošiti u roku 28 dana.

PAKOVANJE

Flakon od 50 ml

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-224/15 od 18. marta 2014. godine

PROIZVODAČ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

(Zoetis manufacturing & Research SpainS.L.)

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina