

Prijedlog uputstva za upotrebu

METRICURE

Suspenzija za intrauterinu upotrebu, 19 g
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač:	Intervet International B.V. Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija
Adresa:	
Podnosilac zahteva:	Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH
Adresa:	Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Metricure, Suspenzija za intrauterinu upotrebu, 19 g

Za upotrebu u veterinarstvu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna šprica od 19 g sadrži 500 mg cefapirina (u obliku benzatina).

INDIKACIJE

Metricure® je namijenjen terapiji subakutnih i hroničnih endometritisa krava (ne prije 14. dana nakon telenja) uzrokovanog bakterijama osjetljivim na cefapirin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na životinjama za koje se zna da su preosjetljive na antibiotike cefalosporine i druge B-laktamske antibiotike. Kontraindicirano je lijek primjenjivati kod gravidnih životinja

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosjetljivosti na cefalosporine se rijetko javljaju.

CILJNE VRSTE

Goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj jedne šprice Metricure treba unijeti u lumen materice pomoću priloženog jednokratnog katetera kako slijedi:

1. Prije upotrebe protresti špricu
2. Pričvrstiti špricu na kateter.
3. Držati grlić materice jednom rukom u rukavici uvučenom u rektum
4. Unijeti kateter kroz grlić u lumen materice, nježnim oscilatornim kretanjem grlića.
5. Ubrizgati Metricure.

U zavisnosti od odgovora, u nekim slučajevima može biti potreban drugi tretman nakon 7-14 dana, ako i dalje postoje klinički znaci.

Kod životinja koje su osjemenjene, Metricure se može koristiti jedan dan nakon osjemenjavanja. U slučajevima piometre, preporučuje se prethodni tretman prostaglandinom kako bi se izazvala luteoliza i uklonili ostaci iz šupljine materice.

KARENCA

Meso i iznutrice: 24 sata

Mlijeko: 12 sati (2 muže).

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati ispod 25°C.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na etiketi.

Čuvati van dohvata i pogleda djece.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere predostrožnosti za upotrebu kod životinja

Upotreba proizvoda treba se zasnivati na ispitivanju osjetljivosti mikroorganizama koji su doveli do patološkog stanja (antibiogram) i pri njoj treba uzeti u obzir zvanične i lokalne antimikrobne politike.

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosjetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosjetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne osjetljivosti na cefalosporin, i obrnuto. Alergijske reakcije na navedene tvari mogu povremeno biti ozbiljne.

Nemojte rukovati ovim proizvodom ako znate da ste osjetljivi, ili ako vam je savjetovano da ne radite sa ovakvim preparatima.

Ovim proizvodom rukujte vrlo pažljivo da izbjegnute izlaganje, koristeći pri tome preporučene mjere predostrožnosti.

U slučaju nehotičnog dodira sa očima, odmah isperite obilnom količinom vode i tražite pomoć ljekara.

U slučaju nehotičnog prolijevanja po koži, kožu treba odmah oprati sapunom i vodom.

Ako se nakon izlaganja pojave simptomi, kao što je osip kože, trebate tražiti pomoć ljekara i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana i očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom gravidnosti i laktacije

Metricure nije namijenjen za upotrebu kod gravidnih životinja. Metricure se može upotrebljavati tokom dojenja.

Interakcije sa drugim lijekovima i ostale forme interakcije

Ovaj lijek ne treba primjenjivati istovremeno sa drugim intrauterinskim antibiotskim preparatima.

Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nužde, antidoti), ako je potrebno

U toku istraživanja o sigurnosti upotrebe kod krava nakon poroda, Metricure primijenjen u količinama do 5 puta većim od preporučene doze tokom 3 uzastopna dana je bio dobro podnesen.

Nekompatibilnosti

Nije poznato.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-2150/19 J.B.; od 18. 02. 2020. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Polietilenski injektor kapaciteta od 19 g. Pipeta za jednokratnu upotrebu i rukavice za jednokratnu upotrebu isporučuju se sa svakim injektorom.
Kutija sa 12 injektora.

Rok upotrebe: Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda upakovanog za prodaju: 3 godine.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

ATCvet kod: QG51AA05

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V.; Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH; Tešanjka 24 A, Sarajevo