

# **SINTOFARM**

# **ADRIATICA**

## **d.o.o.**

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

### **MICOSPECTONE**

**50 mg/ml + 100 mg/ml, injekcioni rastvor za goveda i svinje**

**Za upotrebu u veterinarstvu**

#### **SASTAV u 1 ml:**

Linkomicin	50 mg
(što odgovara linkomicin hlorhidratu)	56,7 mg
Spektinomicin	100 mg
(što odgovara spektinomicin hidrohloridu)	150 mg
Nosač: benzoatni alkohol (E1519) 10 mg, natrijum metabisolfito (E223) 1,5 mg	

#### **DJELOVANJE**

Micospectone je sastavljen od dva antibiotika i to linkomicina (antibiotik iz familije linkozamine) i spektinomicina (antibiotik aminociklitolitik), u odnosu 1:2. Oba antibiotika spriječavaju razvoj bakterija.

Antibiotik linkomicin ispoljava svoje negativno dejstvo na gram + bakterije i mikoplazme. Antibiotik spektinomicin ispoljava svoje negativno dejstvo na gram – bakterije i vrlo mali broj gram + bakterija i mikoplazmi. Nakon aplikacije lijek se u organizmu za vrlo kratak period nađe u organima životinja. Eliminacija viška antibiotika linkomicina vrši se hepatobilijarno, a vrlo male koncentracije se izbacuju i putem mokraće. Neiskorišteni dio spektinomicina se izbacuje putem urina.

#### **INDIKACIJE**

Micospectone se koristi kod svih infekcija izazvanih gram + i gram – bakterijama i mikoplazmama koje su osjetljive na linkomicin i spektinomicin. Najbolje je lijek primjeniti

nakon testa osjetljivosti (antibiograma). Naročito se koristi kod infekcija koje su izazvane sljedećim mikroorganizmima: *Bacilli*, *Bordetelle*, *Campylobacter*, *Clostridiae*, *Coliformi*, *Coccidii*, *Corynebacterii*, *Diplococci*, *Emofili*, *Fusobacterium spp*, *Klebsiellae*, *Leptosprirae*, *Pasteurellae*, *Salamonellae*, *Stafilococci*, *Streptococci*, *Treponemae*, *Micoplasmae*.

### KONTRAINDIKACIJE

Lijek se koristi samo kod vrsta životinja za koje je namjenjen.

Lijek se ne smije koristiti kod životinja koje su osjetljive na antibiotike linkomicin i spektinomicin.

Lijek se ne smije koristiti kod konja, kunića i koka nosilja.

Ne koristiti ga istovremeno sa eritromicinom (zbog kontraindikacija sa linkomicinom).

### DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može aplicirati duboko intramuskularno u sljedećim dozama:

**Goveda:** 1 ml / 10 kg žive mase (što odgovara 5 mg linkomicina/ kg žive mase i 10 mg spektinomicina / kg žive mase dnevno) svakih 12-24 h tokom 2-4 dana

**Svinje:** 1 ml / 10 kg žive mase (što odgovara 5 mg linkomicina/ kg žive mase i 10 mg spektinomicina / kg žive mase dnevno) svaka 24 sata tokom 3-7 dana.

Za pravilno doziranje, prije upotrebe lijeka procijeniti težinu životinje, kako bi se izbjegao predoziranje lijeka.

Ukoliko se injicira veća količina lijeka kod krupnih životinja, injiciranje obaviti na više tačaka, uz blago masiranje nakon aplikacije.

### NUSPOJAVE

Kod svinja su uočene rijetke pojave dijareje, prolaznog tipa. Mogu se uočiti i reakcije tkiva na mjestu uboda injekcije (otok i crvenilo).

### INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Lijek se ne smije aplicirati sa ostalim antibioticima.

Obratiti posebnu pažnju ukoliko se koristi sa miorelaksantima (neurobloktorima).

### KARENCA

**Goveda:** Meso i iznutrice: 20 dana; Mlijeko: 72 sata (6 muža)

**Svinje:** Meso i organi 20 dana.

NAČIN IZDAVANJA: Na veterinarski recept.

### NAČIN ČUVANJA

Lijek se čuva na hladnom, prozračnom i tamnom mjestu (do 25°C). Držati dalje od dohvata djece.

**ROK UPOTREBE**

3 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

**PAKOVANJE:** 50 ml bočica, 100 ml bočica, 250 ml bočica

**POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:** UP-I-06-2-24/17-1400/17 J.B; od 09. novembra 2017. godine

**VLASNIK I PROIZVOĐAČ:** **Fatro** s.p.a, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy  
– Casella Postale/P.O. box 2

**UVOZNIK I DISTRIBUTER:** **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje**, VIII ulica br. 57, 76270  
Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)