

Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za male pse i štenad najmanje tjelesne mase 0,5 kg
Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse najmanje tjelesne mase 5 kg
Za upotrebu u veterinarstvu

1. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Jedna tableta sadržava:

	Tablete za male pse i štenad	Tablete za pse
Djelatne tvari:		
Milbemicin oksim	2,5 mg	12,5 mg
Prazikvantel	25 mg	125 mg

Tablete za male pse i štenad: Žućkasto bijele tablete sa smeđim mrljama, ovalne, bikonveksne, s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Također treba vidjeti odjeljak „12. Posebno(a) upozorenje(a)“.

4. NUSPOJAVE

U vrlo rijetkim slučajevima, nakon primjene kombinacije milbemicin oksima i prazikvantela, u pasa su uočeni opći simptomi (poput letargije), neurološki simptomi (poput tremora mišića i ataksije/nekoordiniranih pokreta) i/ili želučano-crijevni simptomi (poput povraćanja, proljeva, gubitka apetita i slinjenja).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o veterinarskom lijeku, molimo da obavijestite svog veterinaru.

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mali psi i štenad ($\geq 0,5$ kg).

Pas (≥ 5

7. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Veterinarski lijek treba primjeniti s hranom ili nakon hranjenja.

8. KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9. POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Ovaj veterinarski lijek ne zahtijeva nikakve posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Rok valjanosti polovica tableta za male pse i štenad poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 6 mjeseci.

Stoga liječenje životinja mlađih od 4 tjedna s kombiniranim veterinarskim lijekom ne mora biti neophodno.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek na životinjama:

Nakon primjene treba oprati ruke.

U slučaju se tablete nehotice progutaju, pogotovo ako ih progutaju djeca, odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.

Polovice tableta treba vratiti u džepić otvorenog blistera i umetnuti u kartonsku kutiju.

Graviditet i laktacija:

Veterinarski lijek se može primjeniti rasplodnim psima, uključujući gravidne kuje i kuje u laktaciji.