

PRIJEDLOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NOBIVAC PUPPY DP, kutije sa 5, 10, 25 ili 50 jednodoznih ampula.
Liofilizat i otapalo za injekcionu suspenziju.

za primjenu na životinjama

Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija.

Podnosilac zahteva: INTERVET INTERNATIONAL BV PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo.

IME LIJEKA

NOBIVAC PUPPY DP

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sadržaj ampule po dozi za jednu životinju:

- najmanje 5,0 log₁₀ TCID₅₀ živog virusa štenećaka (CDV), soj Onderstepoort,
- najmanje 7,0 log₁₀ TCID₅₀ živog psećeg parvovirusa (CPV), soj 154.

Oba virusa su uzgojena u kulturi tkivnih ćelija. Vakcina sadrži i stabilizator i tragove antibiotika.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET INTERNATIONAL B.V, Boxmeer, Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International bv predstavništvo za BiH, Pijačna 8, Sarajevo.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju mlade štenadi protiv štenećaka i pseće parvoviroze.

Vakcinacija se može vršiti samo ukoliko štenad potiču od redovno vakcinisanih majki od virusa štenećaka i/ili psećeg parvovirusa.”

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi (štenad).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Sadržaj jedne ampule rekonstituisane vakcine treba ubrizgati subkutano. Rekonstituciju izvršiti neposredno prije upotrebe dodavanjem sadržaja jedne ampule (1,0 ml) Nobivac Solvent. Po rekonstituciji, vakcinu treba iskoristiti u roku od 30 minuta.

Program vakcinacije

Nobivac Puppy DP je namijenjen za korištenje kod životinja sa visokim nivoom majčinih antitijela protiv virusa štenećaka i/ili psećeg parvovirusa. Najranija dob u kojoj navedeni nivo antitijela ne ometa vakcinaciju je 6 sedmica starosti kod većine životinja. Kako bi se osigurala zaštita za pojedinu štenad koja ne odgovara na vakcinaciju u ovoj dobi zbog visokog nivoa MDA, te kako bi se pružila zaštita od hepatitisa (CAV1), CAV2 i parainfluence, preporučuje se revakcinacija sa Nobivac DHPPi.

Preporuke vakcinacije sa Nobivac Puppy DP u okviru sveobuhvatnijeg programa vakcinacije:
Dob od 4-6 sedmica - Nobivac Puppy DP

Dob od 8-9 sedmica - Nobivac DHPPi sa Nobivac Lepto

Dob od 12 sedmica - Nobivac DHPPi sa Nobivac Lepto, Nobivac Rabies ili Nobivac RL

Revakcinacija

Preporučuje se revakcinacija pasa protiv:

1. Štenećaka, psećeg hepatitisa - svake 2 godine,
2. Infekcije psećim parvovirusom, virusom pseće parainfluence - svake godine,
3. Bjesnila - svake 3 godine (može se mijenjati u skladu s lokalnim propisima).

SAVJETI ZA PRAVILNU PRIMJENU

Vakcinisati samo zdrave pse a prije inokulacije treba provesti odgovarajući klinički pregled. Nakon vakcinacije, treba izbjegavati kontakt sa potencijalnim izvorima infekcije u periodu od 14 dana nakon inokulacije.

Za primjenu vakcine treba koristiti sterilnu opremu, s tim da treba izbjeći kontaminaciju vakcine tragovima sredstva za dezinfekciju ili etanola.

NEŽELJENA DEJSTVA

Povremeno može doći do blage reakcije preosjetljivosti anafilaktičkog tipa, što se može desiti kod stranih proteina. Takve reakcije, u većini slučajeva, prolaze same od sebe.

KARENCA

Nije primjenjivo.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1883/16 J.B., od 21. februara 2017. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutije sa 5, 10, 25 ili 50 jednodoznih ampula.

Čuvanje: Vakcina: Čuvati u hladnjaku (2°C – 8 °C). Ne zamrzavati! Zaštititi od svjetla.

Otapalo: Nisu potrebni nikakvi posebni uslovi čuvanja.

Rok upotrebe: Vakcina najmanje 24 mjeseca pri 2-8 °C, po rekonstituciji, vakcinu treba iskoristiti u roku od 30 minuta.

Način izdavanja: Izdaje se na veterinarski recept.

ATC vet kod: QI07AD03