



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje  
ID broj: 4254130240000  
PDV broj: 254130240000  
Tel./fax: +387 31/717-168  
e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)  
[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)

## NEOPRIDIMET

### Rastvor za peroralnu upotrebu kod brojlera i kunića

#### SASTAV u 1 ml.:

Sulfadiazin 200 mg.  
Trimetoprim 40 mg.  
Natrijev formaldehid sulfoxylate 2 mg.

#### Nosač:

Destilovana voda do 1 ml.

#### INDIKACIJA:

Koristi se za liječejne bakterijskih infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta kod pilića/brojlera i kunića. Ispoljava svoje negativno djelovanje na bakterijske infekcije izazvane uzročnicima kao što su: pastereloza, kolibaciloza, a posebno izražava svoje negativno djelovanje na uzročnike kokcidioze brojlera.

Pokazao se vrlo uspješni i kod liječenja bakterijskih infekcija kao što su: *Clostridiae spp*, *E. coli*, *Hameophilus spp*, *Klebsiella spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp* i *Vibrio spp*.

#### KONTRAINDIKACIJE:

Ne davati životinjama kod kojih je potvrđena hiper osjetljivost na sulfamide ili koje imaju poteškoće sa radom jetre i bubrega. **Ne koristi se kod koka nosilja koje proizvode jaja za ljudsku ishranu. Lijek se ne smije koristiti ukoliko su životinje vakcinisane protiv kokcidioze.**

#### NEŽELJENA DEJSTVA:

Poznati su slučajevi kristalurije, hematurije, hroničnog toksiciteta kao što je trombocitopenija i leukopenija. Dugotrajna oralna primjena može dovesti do gubitka apetita, manjka vitamina K, promjenama u probavi celuloze i fermentaciji karbohidrata. **U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70 /08).**

#### INKOPATIBILNOSTI:

Proizvod ne bi trebalo davati u kiseloj vodi za piće.

Trimetoprim je inkompatibilan s folnom kiselinom, *p*-aminobenzojevom kiselinom, prokain-benzilpenicilinom i lokalnim anestetima koji imaju *p*-aminobenzojevu kiselinu kao nukleus

(prokain, butakain, benzokain) (Adams, 2001; Brander i sar., 1991; Hoji, 1973), zatim antikoagulansima i paraldehydom.

Sulfonamidi općenito ispoljavaju anagonizam s para-aminobenzojeveom kiselinom (PABA), kao i prokainom, sulfonamidi su antagonisti vitamina K, s metanaminom tvore teško topljive soli (Hadžović, 1998)

Antacidi mogu smanjiti bioraspoloživost sulfonamida (sulfadiazina) ako se primjenjuje istovremen

#### **CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:**

brojleri i kunići

#### **DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:**

Pilići/brojleri i kunići: 0,2 – 0,3 ml rastvora na kg tjelesne težine (odgovara 0,07 – 1,0 ml na litru vode za piće ili 48 – 72 mg na kg tjelesne težine, tokom 3-5 dana.

U slučaju Kokcidioze provesti dvije terapije od po 3 dana sa prekidom između njih od dva dana.

**Savjeti za ispravnu administraciju:** Dobro promješati u vodi za piće. Ne davati u kiselim vodama. Ukloniti ostatke vode iz korita i administrirajte, kao jedini izvor vode za piće koja sadrži medicinski proizvod u količini propisanoj od veterinara. Na kraju liječenja vratiti vodu bez lijeka. Ne mješajte sa čvrstom hranom.

**Obratiti pažnju na dezinfekciju pojilica ili objekta, ili prisustvo hlora u vodi za piće, koji se mora primijentiti na ispravan način, po uputstvu proizvođača. U suprotnom, mogu imati negativan učinak na djelovanje lijeka.**

#### **Specijalna upozorenja za čuvanje:**

Ovaj proizvod ne zahtjeva posebne uslove čuvanja.

Držati van domašaja djece.

Nakon prvog otvaranja proizvod upotrijebiti u roku od 15 dana

Nakon rastvaranja prema uputama za korištenje proizvod upotrijebiti u roku od 12 sati.

Ne koristite veterinarsko medicinski proizvod nakon isteka roka trajanja naznačenog na naljepnici.

#### **Specijalna upozorenja:**

##### **Specijalna upozorenja za korištenje za svaku ciljanu vrstu životinja:**

Ne koristiti kod koka nesilica.

Ne davati životinjama u periodu laktacije. Kod životinja sa sa reduciranim unosom vode koristiti parenteralni tretman koristeći pogodan proizvod koji se ubrizgava, propisanu od veterinara.

Ponovljena ili produžena upotreba treba biti izbjegnuta poboljšanjem prakse upravljanja preko čišćenja i dezinfekcije.

##### **Specijalna upozorenja za korištenje:**

##### **Specijalna upozorenja za upotrebu kod životinja:**

Upotreba proizvoda bi se trebala zasnivati na testu osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Ukoliko ovo nije moguće terapija bi trebala biti bazirana na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim informacijama. Pogrešna upotreba proizvoda može dovesti do povećanja prevalencije bakterija otpornih na snažne sulfonamide i može smanjiti efektivnost tretmana sa drugim klasama antimikrobnih sredstava zbog moguće unakrsne rezistencije.

##### **Specijalna upozorenja za osobe koje primjenjuju proizvod na životinjama:**

Dobra praksa jeste izbjeći direktni kontakt proizvoda sa kožom i očima te inhalaciju tokom rukovanja, te se preporučuje korištenje specijalne zaštitne opreme što podrazumjeva zaštitnu

odjeću, rukavice i masku. U slučaju slučajnog kontakta isprati dobro sa vodom i sapunom. Ne jesti, piti i pušiti tokom rukovanja proizvodom. Oprati ruke nakon upotrebe. Osobe sa poznatom preosjetljivošću na aktivnu supstancu trebaju izbjeći kontakt sa proizvodom. Ne gutati proizvod, u slučaju ingestije potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo /naljepnicu pakovanja.

**Korištenje tokom gravidnosti, laktacije i nesenja:**

Ne koristiti proizvod tokom laktacije. Korištenje u periodu graviditeta je dozvoljeno na osnovu procjene rizika/koristi od strane ovlaštenog veterinara , jer iako nema teratogeni efekat koji se povezuje sa sulfonamidom/trimetoprimom u preporučenim dozama , čini se da veće doze trimetoprima imaju teratogeni učinak.

Ne koristiti kod životinja čija su jaja namjenjena ljudskoj ishrani.

**Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima interakcije:**

Izbjegavati istovremenu upotrebu sa drugim medicinskim proizvodima koji imaju veliku sklonost vezivanja sa proteinima plazme.

**Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti)**

Primjena 10 puta veće doze od preporučene se općenito dobro podnosi.

Ukoliko ima toksičnih učinaka, davanje folne kiseline i opskrba vode za piće *ab libitum* predstavlja preporučenu hitnu proceduru.

**KARENCA:**

Meso i iznutrice:

- Brojeleri: 5 dana
- Kunići: 5 dana

Nije dozvoljena upotreba kod koka nosilja koje proizvode jaja za ljudsku ishranu.

**NAČIN IZDAVANJA:**

Izdaje se na veterinarski recept

**POSEBNE MJERE ZA ČUVANJE LIJEKA:**

Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru

**ROK UPOTREBE:**

3 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvranja je 3 mjeseca, a rok upotrebe poslije rastvranja je 24 sata

**PAKOVANJE:**

1 litra, 5 litara i 10 litara

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:** UP-I- 06-2-24/17-1292/18 J.B; od 18. oktobra 2018. godine

**PROIZVOĐAČ:**

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

**ZASTUPNIK ZA BiH i DISTRIBUTER:**

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)