

Uputstvo za upotrebu

Nobilis AE + Pox

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Naziv

Nobilis AE + Pox

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Nobilis AE+Pox je smrznuta-suha vakcina. Svaka doza sadrži:

$\geq 2.5 \log_{10}$ EID₅₀ živog virusa avijarnog encefalomijelitisa, soj 1143 (Calnek)

$\geq 2.8 \log_{10}$ EID₅₀ živog virusa boginja peradi, soj Gibbs, uzgojenog na SPF kokošijeg jajeta.

Vakcina sadrži stabilizatore i gentamicin sulfat. Pakovano je u dvije odvojene jedinice. Jedna sadrži živu vakcinu i druga sadrži bocu sa sterilnim rastvaračem (UNISOL).

Naziv i adresa proizvođača

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet lijeka

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Pijačna 8, Sarajevo.

Indikacije za upotrebu:

Aktivna imunizacija podmlatka konzumnih I rasplodnih nesilica (pilenki), te purana protiv avijarnog encefalomijelitisa (epidemički tremor) I boginja peradi

Kontraindikacije

Nema.

Ciljana vrsta

kokoši i purani.

Doziranje i način primjene

Rekonstruisati 1000 doza vakcine sa 10 ml rastvarača neposredno prije upotrebe. Aplikator se treba uroniti u vakcinu i onda ubosti ispod krila. Pernati dijelovi krila se trebaju izbjegavati.

Nakon 7-10 dana nakon vakcinacije, nekoliko jedinki treba ispitati na podnošenje vakcine. Zadovoljavajući učinak je blago oticanje na mjestu uboda i formiranje krastice koja otpadne 2-3 nedjelje nakon vakcinacije.

Vakcinalni program

Kokoši se vakcinišu u dobi između 8 i 16 sedmica starosti.

Ćurke se vakcinišu u periodu od 18 i 26 sedmice starosti.

Uputstvo za pravilnu upotrebu

VAKCINISATI SAMO ZDRAVE ŽIVOTINJE. Iako oboljenje ne mora biti izraženo, kokcidioza te infekcije Mikoplazmom, Marekovo oboljenje i druga bolesna stanja mogu uzrokovati komplikacije ili smanjen razvoj imuniteta.

Sve potencijalne kokoši sa istim svojstvima bi se trebale vakcinisati u isto vrijeme.

Ne koristiti manje od jedne doze po ptici.

Ne vakcinisati unutar 4 sedmice prije početka nošenja jaja.

Ne vakcinisati kokoši mlađe od 8 sedmica i ćurke mlađe od 18 sedmica.

Karenca

„0“ dana.

Ne vakcinisati unutar 4 sedmice prije početka nešenja jaja i tokom nesivosti.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Smrznuta-suha vakcina bi se trebala čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, u tami.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Ostaci lijeka ili pakovanja lijek uništavaju se u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Broj i datum odobrenja teksta uputstva za BiH

UP-I-06-2-24/17-748/18 J.B; od 18. 06. 2018. godine

Pakovanje: Bočice od 1000 doza i Unisol otapalo sa aplikatorom.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 36 mjeseci . Sadržaj otvorene bočice treba utrošiti unutar 2 sata od rekonstruisanja.

ATC vet kod: QI01AD**

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Tešanjaska 24A, Sarajevo