

Uputstvo za upotrebu

Nobilis EDS

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Naziv

Nobilis EDS

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Aktivna komponenta (emulzija za injekcije) po dozi (0,5 ml):

Inaktivirani virus sindroma pada nesivosti EDS'76 virus, soj BCI4. Inducira $> 6.5 \log_2$ HI jedinica.

Nobilis EDS sadrži jedan imunogeni soj EDS'76 virusa. Virus je rastao na embrioniziranim jajima i inaktiviran je formalinom. Posljedično je rastvoren u tečnu fazu i u emulziju sa uljnim adjuvantom.

Indikacije za upotrebu:

Aktivna imunizacija rasplodnih i konzumnih nesilica za ublažavanje pada nesivosti, te oštećenja ljuske jajeta, povezanih sa EDS '76 virusom.

Imunost nastaje 4 sedmice nakon cijepjenja.

Trajanje imunosti: tokom cijelog razdoblja nesenja.

Kontraindikacije

Nema.

Ciljana vrsta

Kokoši.

Doziranje i način primjene

Svakoj ptici se treba dati 0.5 ml vakcine intramuskularno u čvrsti grudni mišić ili subkutano u donji dio vrata.

Imunitet: Ako se vakcinacija provela korektno, ptice razvijaju antitijela u količini koja osigurava zaštitu od Egg Drop Syndrom '76.

Reakcije na vakcinu: Kod zdravih ptica nema kliničkih reakcija na vakcinu. Nekoliko sedmica nakon vakcinacije, može se osjetiti mali otok na mjestu injiciranja. Može doći do reakcija lokalnog tkiva.

Uputstvo za pravilnu upotrebu

Vakcinisati samo zdrave ptice. Prije upotrebe vakcine, zagrijati na sobnu temperaturu (15-25°C). Dobro protresite bočicu prije upotrebe. Koristite sterilan pribor za injiciranje. Iskoristite cijeli sadržaj, nakon otvaranja. Ne mješajte sa drugim vakcinama.

Karenca

„0“ dana.

Vakcina se ne primjenjuje na kokošima unutar 4 sedmice prije pronosenja i u toku nesenja.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, u tami. Vakcina se ne smije zamrznuti.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Ostaci vakcine i pakovanja uništavaju se u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Datum odobrenja teksta uputstva za BiH

UP-i-06-2-24/17-747/18 J.B; od 18. 06. 2018. godine

Pakovanje: Bočice od 500 ml = 1000 doza.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 30 mjeseci . Sadržaj otvorene bočice treba utrošiti unutar 2 sata od rekonstruisanja.

ATC vet kod: QI01AA05

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Tešanjaska br.24A, Sarajevo