

Uputstvo za upotrebu

Nobilis IB Ma5

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnositelj zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Nobilis IB Ma5

Za upotrebu u veterinarstvu

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Svaka doza sadrži najmanje $3.0 \log_{10}$ EID₅₀ živog virusa zaraznog bronhitisa peradi, soj Ma5 (serotip Massachusetts) u stabilizatoru.

Indikacije za upotrebu:

Aktivna imunizacija peradi protiv infektivnog bronhitisa, soj Massachusetts. Vakcina se može koristiti za primarnu kao i za sekundarnu zaštitu.

Kontraindikacije

Vakcina se ne smije miješati sa drugim vakcinama.

Ciljana vrsta

Perad.

Doziranje i način primjene

A. Metod prskanjem sprejom. Vakcina se treba rastvoriti u hladnoj, čistoj vodi u kojoj nema ostataka željeza niti hlora. Boćice se trebaju otvoriti pod vodom. Aparat za sprej mora biti bez sedimenta, korozije ili tragova dezinficijensa (po mogućnosti da se koristi samo za vakcinisanje). Voda sa rastvorenom vakcinom, treba se jednako raspršiti po odgovarajućem broju ptica, na udaljenosti od 30-40 cm, po mogućnosti kada se jedinke nalaze zajedno u prostoriji sa prigušenim svjetлом. Za jednodnevnu perad koristi se 0,25 litara vode za 1000 ptica i podesiti sprej da proizvodi kapljice kao sitna kiša. Za starije ptice, rastvoriti 1000 doza po litri vode i postaviti sprej da proizvodi kapi. (aerosolni generatori se koriste samo kada se zna da je to sigurno za ptice).

B. Intranazalno/intraokularno ukapavanje. Rastvoriti vakcincu u fiziološkoj otopini (obično 30 ml za 1000 doza) i primjeniti u smislu standardizirane kapaljke. Jedna kap se nakapava sa visine od par centimetara u jednu nozdru ili jedno oko. Mora se osigurati da je ptica inhalirala nazalnu kap. Za intranazalnu/intraokularnu primjenu dostupan je i poseban rastvarač, Diluent Okulo Nazal.

C. Voda za piće. Vakcina se treba rastvoriti u hladnoj, čistoj vodi, bez tragova željeza i hlora. Boćice se otvaraju pod vodom. Dodavajući 2 grama obranog mljeka u prahu po litri vode, vakcinalni virus zadržava aktivnost znatno duže. Osigurati da unos vakcine vodom za piće bude unesen za 2 sata. Ovisno o vremenskim uslovima, može biti korisno da se pticama uskrati voda prije vakcinacije. Neophodno je osigurati dovoljan broj vodenih pojilica. Rastvoriti 1000 doza u onoliko litara vode koliko je starost ptica po danima, do maksimalno 40 litara. Vakcina se treba dati rano ujutro, jer je to glavni period napajanja ili birati hladni period vrelog dana. Kada se vakcinišu veća jata, mudro je početi sa rastvaranjem samo jedne količine vakcine.

Najbolje rezultate daje primjena putem spreja ili metod okulo/nazalnog nakapavanja. To bi trebale biti metode izbora, posebno ako se vakcinišu mlade ptice. Vakcina se može dati i putem vode za piće. Vakcina bi trebala biti rastvorena u količini vode koja će biti popijena unutar 2 sata od strane životinja.

Prijedlog:

- Vakcinacija jednodnevnih pilića je putem spreja ili intranasalnog/intraokularnog nakapavanja.
- Vakcinacija jednodnevnih koka nosilja je putem spreja ili intranasalnog/intraokularnog nakapavanja.
- Revakcinacija je sa 6 sedmica starosti, koristeći sprej, intranasalno/intraokularno nakapavanje ili koristeći primjenu vode za piće.

Uputstvo za pravilnu upotrebu

Reakcije na vakciju su uglavnom blage ili ih nema. Intenzitet i trajanje vakcinalnih reakcija ovise o zdravstvenom stanju ptica. Higijena i dobra uzgojna praksa su takođe važni u postvakcinalnom periodu u smislu minimiziranja neželjenih reakcija. Pokazano je da vakcinacija u periodu nošenja jaja ne uzrokuje neželjene reakcije na pticama.

Oprati i dezinficirati ruke i opremu nakon vakcinacije. Vakcina se ne treba mješati sa drugim proizvodima.

Karenca

„0“ dana.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Vakcina bi se trebala čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, u tami. Ne zamrzavati

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Ostaci neupotrebljenog preparata, a isteklog roka trajanja ili ostataka upotrebljenog preparata uništavaju se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/00).

Broj i datum odobrenja

UP-I-06-2-24/17-746/18 J.B; od 11. septembra 2018. godine

Pakovanje: Kutije sa bočicama od 10 bočica sa 2500 doza.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 24 mjeseca . Sadržaj otvorene boćice treba utrošiti unutar 2 sata od rekonstruisanja.

ATC vet kod: QI01AD07.

Naziv i adresa proizvođača

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet lijeka

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska br. 24, Sarajevo.