

Prijedlog UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NOBILIS MS LIVE, kutija sa bočicama od 1000 doza i 2000 doza

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV

Adresa: Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

Podnosilac zahteva: Intervet International predstavništvo za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

IME LIJEKA

NOBILIS MS LIVE

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Doza sadržava $10^{6,5} - 10^{8,0}$ CFU¹ žive atenuirane Mycoplasma Synoviae sa umetnutim MS1 stabilizatorom.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija zdravih kokoši radi smanjenja gubitaka proizvodnje jaja uzrokovanih infekcijom Mycoplasma synoviae.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Perad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Rastvoriti vakcinu sa odgovarajućim volumenom vode ili rastvarača da se postigne bar jedna doza po životinji u vidu aerosola ili vakcine u vidu kapi za oči. Ptice se mogu vakcinisati već od dobi od 3 nedjelje.

SAVJET ZA PRAVILNU PRIMJENU

Da bi bila potpuno efikasna, vakcina se mora primjenjivati u obliku aerosola ili kapi za oči na zdravim životinjama u odgovarajućem okruženju i pod dobrim rukovođenjem. Nivo potrebnog imuniteta varira od prakse u primjeni i nivoa ekspozicije.

Aerosolna primjena

Priprema vakcine: Nakon rastvaranja vakcine vodom, mora se koristiti unutar 4 sata.

Koristiti čistu, nehloriranu vodu. Otvoriti bocu pod vodom. Odstraniti zaštitni metalni čep kao i gumeni čep sa bočice. Dodati vakcinu u odgovarajuću količinu vode neophodnu za korištenje kao sprej.

Primjena: Sprej vakcina treba biti u posebnom spreju u dozaži manjoj od 20 mikrona. Ne koristiti dezinficijense ili obrano mlijeko u sprejerima. Koristiti sprejer samo za aplikaciju vakcine. Nakon upotrebe temeljito očistiti. Ugasiti ventilatore dok koristite sprej vakcinu. Takođe zatvoriti odvođe zraka. Slijediti preporuke proizvođača sprejera vezano za volumen vode koja se koristi.

Primjena u obliku kapi za oči

Priprema vakcine: Nakon rastvaranja vakcine mora se koristiti unutar 4 sata. Otvorite vakcinu i okulo-nazalni rastvarač. Spojite ih, koristeći plastičnu cijev za spajanje.

Protresite spojene boce dok se vakcina ne rastvori. Otklonite malu bočicu, prebacite tečnost u plastične bočice i namjestite kapaljke.

Primjena: Ispustite jednu kap u oko svake ptice. Držite bocu za kapanje izvrnutu, u vertikalnoj poziciji, da osigurate pravilnu veličinu kapi i izbjegnute gubitak vakcine.

KARENCA

„0“ dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Držite dalje od dohvata i vidika djece.

Skladištiti/čuvati u frižideru (2°C do 8°C).

Ne smrzavati. Zaštititi od svjetlosti. Ne koristiti po datumu isteka, navedenom na proizvodu. Maksimalan život nakon rastvaranja je 4 sata.

Otklanjanje otpada, nastalog primjenom vakcine, ili vakcine sa isteklim rokom vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03)

POSEBNA UPOZORENJA

Vakcinisati samo zdrave životinje. Iskoristiti cjelokupan sadržaj nakon prvog otvaranja. Izbjeći kontakte sa očima ili kožom. Operator treba koristiti masku i zaštitu za oči. Može se koristiti za vrijeme polaganja jaja.

Primjena antimikoplazmatskih lijekova unutar 5 dana prije ili 2 sedmice nakon vakcinacije, može poništiti djelovanje vakcine.

Nema informacije o sigurnosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim veterinarskim medikamentom. Odluka o korištenju ove vakcine prije ili nakon bilo kojeg drugog veterinarskog medikamenta mora biti donešena za svaki slučaj posebno.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica od 1000 doza i 2000 doza.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 24 mjeseca u opisanim uslovima skladištenja.

ATCvet kod: QI01AE03

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1358/17 J.B., od 27. oktobra 2017. godine

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International bv predstavništvo za BiH, Tešanjaska br.24A Sarajevo, Bosna i Hercegovina.