

Uputstvo za upotrebu

Nobilis Reo 1133

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnositelj zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Nobilis Reo 1133

Za upotrebu u veterinarstvu

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Nobilis Reo 1133 je blaga smrznuto-suha vakcina. Svaka doza sadrži $\geq 3.1 \log_{10}$ TCID₅₀ Reo virusa, soj 1133, uzgojenog na fibroblastima embrija SPF kokoši. Peleta vakcine sadrži stabilizatore i tragove antibiotika. Pakovano je u dvije odvojene jedinice. Jedna sadrži bočicu vakcine a druga sadrži bocu sa sterilnim rastvaračem (Diluent Poultry Freeze Dry).

Indikacije za upotrebu:

Vakcina je namjenjena prevenciji tenosinovitisa (virusnog artritisa) kod pilića starijih od 5 dana.

Kontraindikacije

Životinje se ne vakcinišu unutar 12 sedmica prije početka i u toku perioda proizvodnje jaja u jatima.

NE KORISTITE OVU VAKCINU U KOMBINACIJI SA VAKCINOM ZA MAREKOVO OBOLJENJE ILI SA ŽIVOM GUMBORO VAKCINOM.

Ciljana vrsta

Perad.

Doziranje i način primjene

Injicirati 0.2 ml rastvorene vakcine subkutano u pozadinu vrata.

Priprema vakcine:

1. Preporučava se upotreba Diluent Poultry Freeze Dried – rastvarača za rastvaranje ove vakcine. Koristiti 200 ml rastvarača za 1000 doza vakcine.
2. Oprema za vakcinisanje bi trebala biti sterilna i bez tragova dezinficijensa ili alkohola.
3. Dodati dio rastvarača u bočicu vakcine te dobro protresti.
4. Prebacite rehidriranu vakcinu u špricu i dodajte preostali rastvarač. Nježno promućkajte da se izjednači. Prebacite dio rastvarača špricom da sapere pločicu. Injicirajte tečnost natrag u bocu sa rastvaračem.
5. Sklonite špricu.
6. Napunite prethodno steriliziranu automatsku špricu po uputstvu proizvođača i postavite dozu na 0.2 ml.
7. Vakcina je sada spremna za upotrebu.

Program vakcinisanja: Mnogi faktori se moraju uzeti u obzir u određivanju jasnog vakcinalnog programa za određenu farmu. Da bi bilo u potpunosti efikasno, vakcina se primjenjuje na zdravim pticama, koje su u dobrom stanju. Na odgovor može uticati i starost ptice, te njihov imuni sistem.

Zaštita od Reovirusa uključuje i transplacentarni prenos antitijela sa majke. Da vi se uticalo na ovaj prenos, preporučava se neovisni program koji koristi i inaktivirane i modificirane vakcine živog virusa. U predjelima visoke izloženosti, kokoši mogu postati osjetljive u prvim sedmicama života. Stoga, potreba za ranom vakcinom postaje imperativ. U ovim predjelima, vakcinisanje početi od petog dana starosti. Revakcinacija bi trebala biti od 5 do 7 sedmice starosti i ponovo od 9 do 11 sedmice starosti. U predjelima sa manjom izloženosti, vakcinacije bi trebale biti od 5 do 7 sedmice starosti i ponovo od 9 do 11 sedmice starosti. Da bi se kompletirao ovaj program za ptice iz jata, primjena inaktivirane Reovirus vakcine se preporučava od 18 do 22 sedmice starosti.

Uputa za pravilnu upotrebu

Vakcinisati samo zdrave kokoške. Iako bolest možda nema izražene simptome, kokcidioza te infekcija mikoplazmom, Marekovo oboljenje i druga bolesna stanja mogu uzrokovati komplikacije ili smanjiti razvoj imuniteta.

Treba se potruditi da se smanji stres tokom vakcinacije i tokom post-vakcinalnog perioda.

Jednom rastvorena, vakcina je vrlo osjetljiva i može izgubiti svoju aktivnost ovisno o stanju okoliša.

Iskoristiti ukupan sadržaj kada se otvori bočica.

Ne vakcinišite unutar 12 sedmica prije početka i u toku perioda proizvodnje jaja u jatima.

NE KORISTITE OVU VAKCINU U KOMBINACIJI SA VAKCINOM ZA MAREKOVO OBOLJENJE ILI SA ŽIVOM GUMBORO VAKCINOM.

Karenca

„0“ dana.

Vakcina se ne upotrebljava 12 sedmica prije početka leženja jaja i u toku leženja.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Smrznuta-suha vakcina bi se trebala čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, u tami.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Spalite sve boce i sav neiskorišteni materijal odnosno u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Broj i datum odobrenja

UP-I-06-2-24/17-744/18 J.B; od 11. septembra 2018. godine

Pakovanje: Boćice od 1000 doza.

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 27 mjeseci . Sadržaj otvorene bočice treba utrošiti unutar 2 sata od rekonstruisanja.

ATC vet kod: QI01AD10

Naziv i adresa proizvođača

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet lijeka

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska br.24, Sarajevo.