

Uputstvo za upotrebu

Nobilis Reo IB G ND

(za primjenu na peradi)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnositelj zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo

Nobilis Reo IB G ND

Za upotrebu u veterinarstvu

Kvalitativni i kvantitativni sastav

Aktivna komponenta po dozi (0,5 ml):

IB soj M41: inducira $\geq 6.0 \log_2$ HI jedinica

ND klon 30: inducira $\geq 4.0 \log_2$ HI jedinica po 1/50doze ili sadrži $\geq 50 \text{ PD}_{50}$

Gumboro soj D78: inducira $\geq 14.5 \log_2$ VN jedinica

Reo virusa, soj 1733 i 2408: inducira $\geq 7.4 \log_2$ ELISA jedinica.

Indikacije za upotrebu:

Vakcina se preporuča kao buster vakcina uzgojnog jata kao zaštita na infektivni bronhitis, serotip Massachusetts, zaštitu od oboljenja Newcastle, te za imunizaciju od infekcije Reovirusom i infektivnog oboljenja burse u cilju zaštite potomstva vakcinisanih ptica barem u prvim sedmicama života.

Predloženi program vakcinacije sa Nobilis Reo+IB+G+ND aplicira se oko 16-20 sedmice starosti ali ne manje od 4 sedmice prije očekivanog nošenja jaja. Za optimalni buster efekat, ptice moraju početi sa živom vakcinom protiv infektivnog bronhitisa, oboljenja Newcastle, reovirusne infekcije i infektivnog oboljenja burse.

Najbolji rezultati se postižu ako se vakcinacija sa inaktiviranim virusima desi 6 ili više sedmica nakon primjene žive primovakcinacije ali niti pod kojim uslovima to ne smije biti učinjeno ranije od 4 sedmice od prethodne vakcinacije.

Kontraindikacije

Vakcinišu se samo zdrave životinje. Na mjestu aplikacije može se pojaviti lokalna reakcija tkiva.

Ciljana vrsta

Perad.

Doziranje i način primjene

Svaka ptica mora primiti 0.5 ml vakcine intramuskularno u čvrsti dio grudnog mišića ili subkutano u donji dio vrata.

Uputa za pravilnu upotrebu

Vakcinišite samo zdrave ptice. Prije upotrebe vakcine, dozvoliti adaptacioni period na sobnu temperaturu. Dobro protresti bočicu prije upotrebe. Koristite sterilnu opremu za injiciranje. Koristite ukupan sadržaj, jednom kada se otvori bočica. Ne mješajte sa drugim vakcinama. Ako se osoba koja aplicira vakcincu slučano ubode sebe ili drugog, može doći do lokalne reakcije. Preporučava se savjet ljekara uz naglašavanje da se radi o vakcini u uljnoj emulziji.

Karenca

„0“ dana.

Posebna upozorenja za čuvanje preparata

Čuvati na temperaturi od 2-8°C i izbjegći zamrzavanje. Otvorene bočice bi se trebale iskoristiti unutar 3 sata od otvaranja.

Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka

Postupiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

Broj i datum odobrenja

UP-I-06-2-24/17-743/18 J.B; od 11. septembra 2018. godine

Pakovanje: Boćice od 500 ml (1000 doza).

Način izdavanja: Na veterinarski recept.

Rok upotrebe: 24 mjeseca . Sadržaj otvorene boćice treba utrošiti unutar 3 sata od otvaranja.

ATC vet kod: QI01AA16.

Naziv i adresa proizvođača

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet lijeka

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska br. 24, Sarajevo