



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com

OLIVAC A+B

injekcionalna emulzija za piliće

Za upotrebu u veterinarstvu

OPIS AKTIVNE TVARI I OSTALIH SASTOJAKA

Jedna doza vakcine (0,5 ml) sadrži: Virus ptičje atipične kuge (Newcastle bolest) inaktiviran: $10^{8,5}$ EID₅₀; Adenovirus sindroma pada depozicije (EDS porodica 127) inaktiviran: $10^{7,5}$ EID₅₀; Virus zaraznog bronhitisa (vrsta Ma41, NEV 14, NEV 24) inaktivirani $3 \times 10^{7,5}$ EID₅₀/dozi; **Katalizator:** tečni parafin 0,337 ml; **Konzervans:** natrijev ethylmercury tiosalicilat 0,05 mg.

INDIKACIJE

Koristi se za uspostavljanje aktivnog imuniteta u pilića (lake linije) za reprodukciju/uzgoj kao i koka nosilja od ptičje atipične kuge (bolest Newcastle), ptičjeg zaraznog bronhitisa, kao i sindroma pada nesivosti jaja (EDS).

Imunitet je kompletan 3-4 sedmice nakon prvog vakcinisanja i traje tokom cijelog života.

KONTRAINDIKACIJE

Nema

Lijek se ne daje kokama nosiljama u periodu nesenja.

NEŽELJENE REAKCIJE

Nema zabilježenih. U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/08).

VRSTA ZA KOJU JE NAMJENJENO

- pilići lake linije za uzgoj (rasplodna jata) i koke nosilje.

DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU I NAČIN PRIMJENE

Vakcina se daje injekcijom pod kožu u leđnom dijelu vrata i u dozi od 0,5 ml po životinji.

Program vakcinacije

Vakcinacija se daje do 18 sedmice života prije nošenja jaja. Da bi se postiglo maksimum zaštite korištenjem OLVAC A+B, savjetuje se da se prije njene primjene izvrši vakcinacija živom oslabljenom vakcinom protiv ptičje atipične kuge i zaraznog bronhitisa, po uobičajenim šemama koje se slijede za prevenciju ove zaraze (Program imunoprofilakse).

UPOZORENJE ZA KOREKTPU PRIMJENU

Prije korištenja vakcine treba sačekati da ista postigne sobnu temperaturu (18°C-22°C). Prije i tokom korištenja protresti dobro flakom.

KARENCA

0 dana

Lijek se ne daje kokama nosiljama u periodu nesenja.

POSEBNE MJERE ZA ČUVANJE

OLIVAC A+B treba čuvati u frižideru na temperaturi između +2 °C do +8 °C. Ne zamrzavati.

Nakon otvaranja flakoma vakcina mora biti iskorištena u roku od 24 sata.

Čuvati izvan domaćaja djece.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Vakcina se može upotrebljavati samo na zdravim životinjama.

Posebne mjere opreza za korištenje na životinjama

Prije korištenja vakcine treba sačekati da ista postigne sobnu temperaturu (18°C-22°C). Prije i tokom korištenja protresti dobro flakon. Nakon otvaranja flakon vakcina mora biti iskorištena u roku od 24 sata.

Posebne mjere opreza kojih se moraju pridržavati osobe koje vrše vakcinaciju životinja.

Lijek se upotrebljava uz korištenje zaštitne maske i rukavica. Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno ubadanje/samovakcinisanje može izazvati snažan bol i otekline, pogotovo ako se injektiralo u udove ili u prste i u rijetkim slučajevima, može izazvati gubljenje prsta koji je pogodjen ukoliko se ne primje odmah medicinsko lječenje. U slučaju nehotičnog samovakcinisanja, čak i malih doza ovog proizvoda, treba se smjesta obratiti lječniku i pokazati mu uputstvo za upotrebu lijeka. Ukoliko bol ostaje i 12 sati nakon lječničkog pregleda, treba se ponovo obratiti lječniku.

Za ljekara nakon slučajnog injiciranja:

Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Nehotično samovakcinisanje, čak i malih doza ovog proizvoda, može izazvati vidno oticanje koje može, na primjer, izazvati ishemisku nekrozu pa čak i gubitak prsta. Zahtjeva se SMJESTA stručnu procjenu hiruškog tipa i može biti potrebna jedno brzo zasjecanje i irigacija mesta uboda, pogotovo ako se radi o mekim tkivima prsta ili tetiva.

NIJE DOZVOLJENA upotreba tokom nošenja jaja- sigurnost vetrinarskog lijeka tokom nošenja jaja nije utvrđena.

Interakcija sa drugim vetrinarskim lijekovima i ostali oblici interakcije

Nema informacija u vezi sa kompatibilnosti vakcine sa drugima. Dakle nije se pokazale neškodljivost i nedjelotvornost ukoliko je proizvod korišten sa drugima.

Predoziranje (simptomi, postupak hitne pomoći, protivotrovi ukoliko je potrebno)

Primjena dvostrukе doze može izazvati prolazno stanje depresije (1-2 dana) i prolaznokalnu reakciju kod otprilike 10% jedinki.

Inkompatibilnost

Lijek se ne smije miješati sa drugim vakcinama ili hemoterapeuticima.

POSEBNE MJERE OPREZA KOJE TREBA PRIMJENITI ZA UKLANJANJE PROIZVODA KOJI NISU UPOTREBLJENI ILI EVENTUALNOG OTPADA

Svi vetrinarski lijekovi koji nisu iskorišteni i otpadni materijal koji od njih potiče mora biti odložen i po odgovarajućem sistemu sakupljanja i uništavanja koji važi za lijekove koji nisu iskorišteni ili one kojima je prošao rok trajanja, u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17- 1293/18 J.B; od 07. 11. 2018. godine

PAKOVANJE:

Bočica od 250 ml (500 doza)

Bočica od 500 ml (1000 doza)

PROIZVODAČ:

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

ZASTUPNIK/DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com