

---

---

**PRIJEDLOG UPUTSTVA ZA LIJEK**

---

## **NAZIV**

**Orbenin® LA**

za upotrebu u veterinarstvu

### **SASTAV:**

**1 injektor (3 g) sadržava**

#### **Aktivne supstance:**

kloksacilina u obliku obliku kloksacilin-natrija 200,0 mg

#### **Pomoćna sredstva:**

uljnog nosača do 3 g.

## **INDIKACIJE**

Lijek je indikovan za intramamrnu primenu u liječenju mastitisa krava, uzrokovanih Gram pozitivnim organizmima u toku laktacije.

Da bi se postigli najbolji rezultati trebalo bi ga koristiti kod prvih znakova mastitisa.

Proizvod je indikovan za korišćenje I kod ovaca u lečenju mastitisa u fazi odbijanja janjadi. Orbenin je efikasan protiv *Streptococcus agalactiae* I drugih streptokokus vrsta, penicillin otpornih i osetljivih streptokoka i *Actinomyces pyogenes*.

Kod stafilocoknog mastitisa veoma je važno adekvatno trajanje liječenja , da bi se postiglo kliničko i bakteriološko izlječenje.

Orbenin LA sa svojim karakteristikama laganog ispuštanja aktivne supstance, stvoren je da zadovolji ove kriterijume.

## **KONTRAINDIKACIJE**

Lijek se ne daje kravama u suhostaju, niti životinjama preosjetljivim na β-laktaminske Antibiotike (peniciline, cefalosporine, cefamicine I dr.), zbog moguće unakrsne alergije.

Lijek se ne smije primjenjivati unutar 28 dana prije telenja

## **NEŽELJENE REAKCIJE**

Nisu primjećene.

## **CILJANE VRSTE :**

Krave u toku laktacije

Ovce u periodu odbijanja

## **DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU, NAČIN I METOD ADMINISTRACIJE:**

Dati tri sadržaja injektora po zaraženoj četvrti - jedan špric svakih 48 sati. Pojedinačna šprica se smije koristiti samo jednom.

---

---

Primjena: Očistite i dezinficirajte vime poslije mužnje. Ubacite u vime i primijenite nježan i kontinuirani pritisak dok se ne istisne suspenzija. Tretirane četvrtine mogu se musti u uobičajenom vremenu koje slijedi nakon liječenja.

#### **Ovce**

Doziranje: jednokratno, jedan injektor treba dati u svaku polovicu vimena ovce.

#### **SAVJET O ISPRAVNOJ ADMINISTRACIJI:**

Važno je da se slijedi jednostavni higijenski postupak. Jedna osoba treba okrenuti i držati ovcu, dok druga osoba daje lijek. Očistite i dezinficirajte kraj svakog vimena. Stavite vrh injektora na otvor vimena i primijenite nježan, kontinuirani pritisak dok se ne istisne suspenzija u vime. Kanulacija otvora vimena nije potrebna niti poželjna. Koristite novi injektor za svaku polovicu vimena radi izbjegavanja mogućnosti unakrsne kontaminacije tokom aplikacije.

#### **KARENCA:**

Meso i organi goveda i ovaca: 7 dana

Goveda (mlijeko): 96 sati.

Lijek se ne upotrebljava kod ovaca čije se mlijeko koristi za ljudsku upotrebu.

#### **SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SKLADIŠTENJE :**

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi do 25 °C

#### **SPECIJALNA UPOZORENJA**

##### **- Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama:**

Penicilin i cefalosporin može izazvati preosjetljivost (alerгију) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta s kožom. Preosjetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporin i obrnuto. Povremeno, alergijske reakcije na ove supstance mogu biti ozbiljne.

Nemojte koristiti ovaj proizvod ako znate da su osjetljivi ili ako ste bili upozorenici da ne radite s takvim preparatima. Rukovati s proizvodom sa velikom pažnjom, radi zaštite, uzimajući u obzir sve preporučene mjere opreza.

Ako se javi simptomi nakon izlaganja, kao što su osip na koži, potrebno je potražiti liječničku pomoć i pokazati doktoru ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili problema s disanjem su ozbiljni simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Operite ruke nakon upotrebe.

##### **Korištenje tokom graviditeta, laktacije, nošenja**

Orbenin LA je indikovan za korišćenje kod krava u laktaciji i ovaca kod odbijanja jagnjadi. Ovaj lijek se ne smije koristiti kod krava u suhostaju ili u preventivne svrhe kod krava i ovaca.

---

## **Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima**

### **Interakcije**

Nisu poznate

### **Predoziranje (simptomi,postupci u slučaju nepredvidjenih situacija , protivotrovi), u slučaju potrebe**

Orbenin LA nije iritatantan za tkivo vimena i dobro se podnosi kod ciljanih vrsta.

U slučaju nanamernog predoziranja ne očekuju se neželjeni efekti.

### **Inkompatibilnost**

Nije poznata

### **Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

### **ROK UPOTREBE:**

3 godine.

### **PAKOVANJE:**

Injecto od 3 g.

Kutija sa 12 injektora x3g suspenzije

### **NAČIN IZDAVANJA :**

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

### **PROIZVODJAČ:**

Haupt pharma Latina s.r.l

Italija, Latina, Borgo san Michele, Strada Statale 156, Km 47,600

### **ZASTUPNIK:**

THE HEADHUNTER D.O.O.

MARŠALA TITA 28

71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:** UP-I-06-2-24/17-681/17 J.B, od 14. decembra 2017. godine