



## **Orbeseal**

### ***Intramamarna suspenzija***

#### **SASTAV**

Jedan intramamarni injektor od 4g sadrži:

#### ***Aktivna supstanca:***

Bizmut subnitrat 2,6g

#### ***Pomoće supstance:***

Tečni parafin

Aluminijum di-tri stearat

Koloidni anhidrovani silikon

#### **DJELOVANJE**

Orbeseal u svakoj četvrti vimena stvara fizičku barijeru protiv ulaska bakterija čime se sprečava učestalost novih intramamarnih infekcija u toku suhostaja.

Bizmut subnitrat se ne apsorbuje u mliječnoj žlijezdi, ali se nalazi kao čep u sisi sve dok se fizički ne ukloni (prikazan je kod krava u suhostaju da može biti do 100 dana).

#### **INDIKACIJE**

Prevenција novih intramamarnih infekcija u periodu zasušenja. Kod krava za koje se smatra da su izliječene od kliničkih mastitisa, može se koristiti kod kontrole mastitisa. Selekcija krava koje se tretiraju, može se zasnivati na kliničkoj procjeni. Kriterijum može biti baziran na broju somatskih stanica kod pojedinih krava ili na testovima za otkrivanje subkliničkih mastitisa ili bakteriološkog uzorkovanja.

#### **KONTRAINDIKACIJE**

Ne koristiti kod prisustva subkliničkih mastitisa kao ni kod kliničkih mastitisa u vrijeme zasušenja.

#### **OBLIK**

Intramamarna suspenzija

#### **NAČIN PRIMJENE I DOZE**

Za intramamarnu upotrebu. Jednokratna upotreba. Sadržaj jednog šprica treba ubrizgati u četvrt vimena odmah nakon posljednje muže. Ne masirati sisu niti četvrt poslije ubrizgavanja sadržaja.

Treba voditi računa da se ne izazove infekcija i smanji rizik od eventualnih mastitisa.

Neophodno je da se sisa temeljno očisti i dezinfikuje, maramicama natopljenim alkoholom.

Sise treba brisati sve dok maramice više nisu vidljivo prljave.

Prije infuzije dobro osušiti sise. Sadržaj ubrizgati aseptično i voditi računa da se izbjegne kontaminacija vrha intramamarnog šprica.  
Nakon infuzije preporučljivo je umočiti sisu u dezinficijens ili koristiti sprej.

#### **NUSPOJAVE**

Nema

#### **NAPOMENA**

Tokom graviditeta, preparat može biti korišten jer se ne resorbuje. Po telenju, može se desiti da ga tele proguta. Gutanje Orbesila ne uzrokuje nikakve neželjene reakcije kod teladi.

Orbesil je kontraindikovano u vrijeme laktacije krava. Ukoliko se slučajno aplikuje, može da izazove povećanje broja somatskih ćelija. U tom slučaju se ručno skine zapečaćeni dio i nisu potrebne dodatne mjere. Oprati ruke nakon rukovanja sa preparatom

#### **KARENCA**

Meso: 0 dana

Mlijeko: 0 dana

#### **NAČIN ČUVANJA**

Na tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25 °C) i izvan dosega djece.

#### **NAČIN IZDAVANJA**

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

#### **ROK UPOTREBE**

Rok upotrebe je otisnut na ambalaži i traje 5 godina.

#### **PAKOVANJE**

Kutija sa 24 injektora.

#### **BROJ I DATUM RJEŠENJA**

UP-I-06-2-24/17-220/15 od 18. marta 2015. godine

#### **PROIZVOĐAČ**

Zoetis Manufacturing Italia s.r.l.  
(Haupt Pharma Latina S.r.l. Italija)

#### **ZASTUPNIK**

Expertus Solutio doo Sarajevo  
Dobrinjska do br.27  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina