

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o

VIII Ul.Broj 57,76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel/Fax: +38731/717-168

E-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

## OSSITETRA 200 PREMIX

**Premiks za mediciniranu hranu za svinje,kuniće,ribe, fazane,  
patke i prepelice**

**SASTAV:** 1 gram proizvoda sadrži:

Aktivna supstanca: Oksitetraciklin      200 mg ( kao oksitetraciklina bihidrat)

Nosač do                                    1000 mg

### **ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA:**

Svinje,kunići,ribe,fazani,patke i prepelice.

### **INDIKACIJE:**

Koristi se u liječenju respiratornih i gastrointestinalnih infekcija izazvanih Gram+ i Gram – bakterijama osjetljivim na Oksitetraciklin.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

**SVINJE:** Koristi se u liječenju bakterijskih infekcija respiratornog i digestivnog trakta izazvanih Gram + i Gram – bakterijama osjetljivih na Oksitetracikline

**KUNIĆI:** Koristi se u liječenju bakterijskih infekcija kao sto su Colibaciloza, Pastereloza,Salmoneloza.

**RIBE:** Koristi se u liječenju bakterijskih infekcija digestivnog i respiratornog trakta izvanih Gram + i Gram – bakteijama.

**FAZANI,BISERKE,PATKE I PREPELICE:** Koristi se u liječenju infekcija respiratornog,gastrointestinalnog i probavnog trakta izazvanih Gram + i Gram – Bakterijama koje su osjetljive na Oksitetraciklin.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ne davati životnjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na tetracikline. Ne davati životnjama koje imaju insuficijenciju bubrega. Ne koristiti u uzgajalistima kod životinja kod kojih je utvrđena rezistencija na tetracikline.

### **NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE**

**SVINJE:** Umiješati u suvu hranu od 9-12 mg lijeka/ na kg žive mase kod entero infekcija tokom 3-5 dana

-Kod liječenja Mikoplazme min 12 mg lijeka/ kg žive mase tokom 3-5 dana

-Kod liječenja Atrofičnog rinitisa od 12-15 mg lijeka/kg žive mase tokom 3-5 dana.

**KUNIĆI:** Umiješati u hrani 40-80 mg lijeka/kg žive mase koji odgovaraju 3500 mg-7500 mg/kg hrane tokom 3-5 dana.

**RIBE:** Umiješati u hrani 75 mg lijeka/kg žive mase koji odgovaraju 550 mg-1450 mg / kg hrane tokom 7 dana.

**PERAD:** Umiješati u hrani od 9-12 mg/kg žive mase tokom 3-5 dana.

### **UPOZORENJE**

Uzimanje ljekovite hrane od strane životinja može se mijenjati u odnosu na tok bolesti. Za one životinje kod kojih se uoči smanjeno uzimanje vode treba primjeniti liječenje parenteralnim putem koristeći odgovarajući proizvod u vidu injekcija po savjetu veterinarskog ljiječnika. Kod nepreživara može smanjiti sintezu i raspoloživost vitamina grupe B i K. Učestalo korištenje ili produženo treba izbjegći, poboljšavanjem uvjeta držanja i putem čistoće i dezinfekcije.

**Posebne mjere opreza kod primjene:**

**Posebne mjere opreza primjene kod životinja:**

Ovaj proizvod treba koristiti samo na osnovu rezultata osjetljivosti bakterija koje su izolirane kod životinja koje treba liječiti. Ukoliko to nije moguće, terapija treba biti bazirana na lokalnim epidemiološkim informacijama (regije, preduzeća) o podložnosti ciljnih bakterija.

Neodgovarajuća upotreba proizvoda u odnosu na ono što je navedeno u uputstvima za upotrebu mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na tetraciklin i smanjiti djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima iz iste ili druge klase zbog moguće pojave unakrsne otpornosti.

Ne ostavljati ljekovitu hranu na dohvati životinja koje nisu pod terapijom.

Ne koristiti u vodi za piće niti u tečnoj hrani.

Ne ostavljati ljekovitu hranu na dohvati drugih životinja koje nisu pod terapijom ili divljih životinja.

**Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:**

Izmješati dobro u čvrstu hranu.

Mješanje treba biti obavljeno u uređaju u kojem je dozvoljeno korištenje ljekovitih mješavina. Radnici u tu svrhu moraju nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću: kombinezon, nepropusne rukavice i zaštitnu masku za lice. Ne udisati, izbjegavati kontakt sa kožom, očima i sluzokožom. U slučaju slučajne kontaminacije kože ili očiju isprati dobro vodom i sapunom. Ne jesti, ne piti ili pušiti tokom rukovanja sa proizvodom. Dobro oprati ruke nakon korištenja proizvoda. Ukoliko iritacija ostane, konsultovati lječnika i pokazati etiketu ili prospekt proizvoda. Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na ossitetraciclin moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom.

**INKOMPATIBILNOST**

Ovaj lijek ne koristiti istovremeno sa ostalim antibioticima.

### NAČIN ČUVANJA

Čuvati na hladnom i suhom prostoru, koji je zaštićen od direktnе sunčeve svjetlosti.

### KARENCA

Svinje: meso i iznutrice 10 dana

Kunići: meso i iznutrice 12 dana

Ribe: meso i iznutrice 500 stepeni/dan

Fazani,biserke i patke. Meso i iznutrice 12 dana

Prepelice: meso i iznutrice 8 dana.

Nije dozvoljena upotreba lijeka kod peradi tokom nošenja jaja.

### NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

### ROK UPOTREBE

Rok trajanja originalnog pakovanja je 2 godine. Nakon otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 2 mjeseca.

Rok trajanja hrane u kojoj je umiješan lijek je 2 mjeseca.

### NAČIN PAKOVANJA

Vreće od 10 kg i 25 kg.

### UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadu („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-768/16 J.B.; 24.06.2016

PROIZVOĐAČ: Filozoo Srl; Via del Commercio 28/30 Carpi ( Modena) Tel:  
+39059637311.