

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO FILOZOO

Otopina za oralnu upotrebu

SASTAV

100 g sadrži:

Aktivna supstanca :	Oksitetraciklin bihidrat 200 g
Nosač:	1.000 g

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Svinje, telead, brojleri, koke nosilje, ćurani i kunići

INDIKACIJE

Koristi se u liječenju respiratornih i gastrointestinalnih infekcija izazvanih Gram+ i Gram – bakterijama osjetljivim na Oksitetraciklin.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

SVINJE: Koristi se u liječenju bakterijskih infekcija respiratornog i digestivnog trakta izazvanih Gram + i Gram – bakterijama osjetljivih na Oksitetracikline.

KUNIĆI: Koristi se u liječenju bakterijskih infekcija kao sto su Colibaciloza, Pastereloza, Salmoneloza.

BROJLERI, KOKE NOSILJE, ĆURKE: Koristi se u liječenju infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i reproduktivnog trakta izazvanih Gram + i Gram – bakterijama koje su osjetljive na Oksitetraciklin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na tetracikline. Ne davati životinjama koje imaju insuficijenciju bubrega. Ne koristiti u uzgajalištima kod životinja kod kojih je utvrđena rezistencija na tetracikline.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Utvrđiti preciznu tjelesnu masu životinja. Lijek dobro rastvoriti u vodi za piće ili u tekućoj hrani.

TELAD KOJA DOJE: 25 – 40 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase rastvoriti u rekonstituiranom mlijeku što odgovara 12,5 – 20 g proizvoda na svakih 100 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana.

SVINJE: 20 – 40 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase rastvoriti u vodi za piće ili u tečnoj hrani što odgovara 10 – 20 g proizvoda na svakih 100 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana.

BROJELERI, ĆURANI: 40 – 70 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase davati rastvoreno u vodi za piće, što odgovara 20 – 35 g proizvoda na svakih 100 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana.

KOKE NOSILJE: 25 – 50 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase davati rastvoren u vodi za piće, što odgovara 12,5 – 25 g proizvoda na svakih 100 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana.

KUNIĆI: 40 – 80 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase davati rastvoren u vodi za piće, što odgovara 20 – 40 g proizvoda na 100 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana.

UPOZORENJE

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu Nema

Posebne mjere opreza kod primjene:

1. Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Ovaj proizvod treba koristiti samo na osnovu rezultata osjetljivosti bakterija koje su izolirane kod životinja koje treba liječiti. Ukoliko to nije moguće, terapija treba biti bazirana na lokalnim epidemiološkim informacijama (regije, preduzeća) o podložnosti ciljanih bakterija.

Neodgovarajuća upotreba proizvoda u odnosu na ono što je navedeno u upustvima za upotrebu mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na oksitetraciklin i smanjiti djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima iz iste ili druge klase zbog moguće pojave unakrsne otpornosti. Primjena ovog lijeka može biti zamjenjena tokom bolesti. Za one jedinice koje nedovoljno uzimaju vodu za piće treba nastaviti liječenje injekcijama, koristeći odgovarajući proizvod ali samo po savjetu veterinarskog lječnika.

Učestalo ili produženo uzimanje ovog lijeka treba izbjegavati poboljšavajući uvjete držanja životinja.

Ne ostavljati ljekoviti rastvor na dohvata životinja koje nisu pod terapijom.

Ne koristiti u čvrstoj hrani.

2. Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Izmješati dobro u vodi za piće.

Primjenom odgovarajuće procedure pripreme i davanja proizvoda nije potrebno poduzeti posebne mjere zaštite za radnika. U svakom slučaju dobro je izbjeći udisanje i direktan kontakt. Savjetuje se korištenje zaštitne maske i rukavica odgovarajućih za rukovanje proizvodom.

Ne jesti, ne piti ili pušiti tokom rukovanja sa proizvodom. Dobro oprati ruke nakon korištenja proizvoda. U slučaju slučajne kontaminacije kože ili očiju isprati dobro vodom i sapunom. Ukoliko iritacija ostane, konsultovati liječnika i pokazati etiketu ili prospekt proizvoda. Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na oksitetraciklin moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom.

INKOMPATIBILNOST

Ovaj lijek ne koristiti istovremeno sa ostalim antibioticima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na hladnom i suhom prostoru, koji je zaštićen od direktne sunčeve svjetlosti.

KARENCA

- Telad koja doje:
 - meso i iznutrice: 20 dana.
- Svinje:
 - meso i iznutrice: 18 dana
- Brojleri i ćurani:
 - meso i iznutrice: 7 dana
- Kunići:
 - meso i iznutrice: 12 dana
- Koke nosilje:
 - jaja: 5 dana

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na Veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Rok trajanja originalnog pakovanja je 6 mjeseci.

Nakon otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 1 mjesec.

Nakon rastvaranja veterinarskog lijeka u vodi, rok trajanja je 12 sati.

NAČIN PAKOVANJA

Kante od 1 kg i 5 kg.

UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-773/16 J.B.; 24. 04. 2016

PROIZVOĐAČ: **Filozoo Srl**; *Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)*

Tel: +39059637311