

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

OXI 50 SUPERSOL

Prašak za peroralnu primjenu

SASTAV

Jedan gram proizvoda sadrži:

Aktivna supstanca : Oksitetraciklin 0,50 g (kao oksitetraciklin hidrohlorid)

Nosač: do 1 g

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Svinje, brojleri, koke nosilje, ćurke, biserke, patke, prepelice, guske i kunići.

INDIKACIJE

Liječenje bakterijskih septikemija, infekcija respiratornog i gastro-intestinalnog trakta izazvanih bakterijama osjetljivim na oksitetraciklin.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na Oksitetracikline i Tetracikline uopšte.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Da bi se izbjeglo nedovoljno doziranje lijeka, treba ustanoviti, na najprecizniji način, tjelesnu težinu životinja. Lijek, prije upotrebe, treba dobro rastvoriti u vodi za piće.

- *Svinje*: 20 mg Oksitetraciklina/1 kg žive mase životinje, tokom 3 – 5 dana, što odgovara 400 mg proizvoda/10 kg žive mase na dan podjeljeno u dvije doze.
- *Kunići, brojleri, koke nosilje, ćurke, biserke, patke, prepelice i guske*: 20 mg oksitetraciklina/1 kg žive mase, tokom 3 – 5 dana, što odgovara 400 mg proizvoda/1 l vode.

UPOZORENJE

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Ne mješati sa čvrstom hranom.

Uzimanje lijeka od strane životinja može se mijenjati u odnosu na tok bolesti. Za one životinje kod kojih se uoči smanjeno uzimanje vode treba primijeniti liječenje parenteralnim putem koristeći odgovarajući proizvod u vidu injekcija po savjetu veterinarskog ljeknika. Učestalo korištenje ili produženo treba izbjeći, poboljšavanjem uvjeta držanja.

Posebne mjere opreza kod primjene:

1. Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Zbog mogućih varijacija u klimatskim uvjetima i geografskim karakteristikama senzibilitet ciljane vrste bakterija na oksitetraciklin preporuča se obaviti bakteriološki nalaz i testove osjetljivosti. Neodgovarajuća upotreba proizvoda u odnosu na ono što je navedeno u upustvima za upotrebu proizvoda mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na oksitetraciklin te smanjiti djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima iz iste ili druge klase zbog moguće pojave unakrsne otpornosti.

Ne ostavljati ljekoviti rastvor na dohvrat životinja koje nisu pod terapijom.

Treba posvetiti posebnu pažnju poboljšanju uvjeta držanja i uzgoja da bi se izbjegla bilo kakva situacija stresa.

2. Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Proizvod treba dobro rastvoriti u vodi za piće ili u tečnoj hrani.

Radnici koji rukuju s proizvodom u tu svrhu moraju nositi posebnu odgovarajuću zaštitnu odjeću: koja se sastoji od zaštitne odjeće/kombinezona, nepropusnih rukavica i zaštitnu masku za lice. Ne udisati, izbjegavati kontakt sa kožom, očima i sluzokožom. Ne gutati; U slučaju nenamjernog gutanja, odmah se treba obratiti ljekniku i pokazati etiketu ili prospekt proizvoda. U slučaju slučajne kontaminacije kože ili očiju isprati dobro vodom i sapunom. Ukoliko iritacija ostane, konsultovati ljeknika. Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljive na oksitetraciklin moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja proizvodom. Oprati dobro ruke nakon upotrebe lijeka.

KARENCA

- *Svinje, brojleri, ćurke, biserke, patke, prepelice, guske i kunići*:
- meso i iznutrice: 7 dana.

- Koke nosilje:
 - jaja: 0 dana.

NAČIN IZDAVANJA:

Izdaje se na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati u tamnoj, suhoj i prozračenoj prostoriji.

ROK UPOTREBE

Rok trajanja veterinarskog lijeka 24 mjeseca.

Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 6 mjeseci.

Nakon rastvaranje u vodi rok trajanja je 24 sata.

PAKOVANJE

- 1 kg
- 5 kg

UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-767/16 J.B.; 24. 06. 2016.

PROIZVOĐAČ: **Filozoo Srl**; *Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)*

Tel: +39059637311