

OXITETRACICLINA 200 L.A.

Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: Oksitetraciklin 200mg; eksipijens sa dugotrajnim djelovanjem q.s.1ml

Djelovanje: Oksitetraciklin je bakteriostatski antibiotik koji djeluje na bakterijske ribozome inhibirajući sintezu proteina. Ima veoma širok spektar djelovanja koji uključuju Gram pozitivne bakterije, Gram negativne bakterije, neke velike virusne, protozoe, spirohete, rikecije, mikoplazme i klamidiju.

Zahvaljujući dugotrajanoj formuli pojedinačna injekcija Oxitetraciclina 200 LA može postići kompletну antibioterapiju, s obzirom na činjenicu da djelotvorni novo u krvi održava tri dana.

Interakcije i ciljani domaćini:

- Goveda:

Transportna groznica, enteritis i gastroenteritis, infektivna pneumonija, metritis, mastitis

- Svinje:

Bronhopulmonalna infekcija, infektivni enteritis i gastroenteritis, MMA sindrom, pastereloza i artritis.

- Ovce i koze:

Respiratorne infekcije, enteritis, infektivni abortus, pielonefritis, i bruceloza.

Doziranje:

Goveda, svinje, ovce i koze:

Ubrizgati 1ml na 10kg tjelesne mase u pojedinačnoj dozi. U težim slučajevima ubrizgavanje se može ponoviti za 72 sata.

Intramuskularna primjena.

Mjere opreza:

Ukoliko je koncentracija veća od:

20 ml kod goveda;

10ml kod svinja

5ml kod ovaca i koza

Preporučuje se davanje podijeljenih doza na dvije strane za ubrizgavanje.

Kontraindikacije: Ne koristiti na životnjama sa bubrežnim poremećajima i u prvim mjesecima života.

Neželjene reakcije: Visoka koncentracija aktivne supstance i dugotrajni učinak mogu izazvati slabo prolazno oteknuće na strani ubrizgavanja koje spontano nestaje. Na isti način, alergijska reakcija kod goveda može se razviti i manifestirati kao edem na strani ubrizgavanja i postepeno nestati.

Interakcije: Nisu opisane.

Oxitetraciklin se taloži u kostima i utiče na rast kostiju ukoliko se daje mlađim životnjama. Preporučljivo je izbjegavanje administracije oksitetraciklina tokom prvih mjeseci nakon rođenja.

Predoziranje: Predoziranje je rijetko, zbog fiksne doze. Hepatotoksičnost može nastati kao rezultat česte administracije i visokih doza, u ovim slučajevima tretman treba biti prekinut i dati sredstva za zaštitu jetre.

Karenca:

Goveda, ovce, koze, svinje: meso i organi - 22 dana

Lijek se ne koristi kod životinja (goveda, ovce, koze) čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način čuvanja: Držati zaštićeno od vlage, svjetlosti i toploće i temperature ispod 25°C.

Eventualno preparat može postati tamniji, što ne uzrokuje gubitak aktivnosti.

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: bočica 10ml, 50ml, 100ml, 250ml

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Spanija

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica

Broj rješenja izdatog od FMPVS BiH: UP-I- 06-2-24/17-1311/15 J.B, 19.11.2015.