

# SINTOFARM

# ADRIATICA

## d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje  
ID broj: 4254130240000  
PDV broj: 254130240000  
Tel./fax: +387 31/717-168  
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

### OXY75 PESCI

**Medicirani premiks za pastrmke, brazine, orade, iverak, jegulje i šarane**

#### SASTAV

Aktivne tvari: Oksitetraciklin (kao hidroklorid) 750 mg  
Nosač: do 1 g

#### ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Pastrmke, brazine, orade, iverak, jegulje i šarani.

#### INDIKACIJE

Koristi se u liječenju infekcija izazvanih *Loctococcus garviege* (Listeria) *Vibro anguillarum* (vibroza) i *Aeromonas hydrophilia* (aeromonose) osjetljivih na oksitetraciklin.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

#### KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na oksitetracikline uopšte ili na jednu od pomoćnih tvari. Mogući efekat smanjenog rasta.

#### NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Davati 55 mg lijeka/1 kg žive mase tokom 7 – 10 dana. Da bi se obezbjedila potrebna dnevna doza lijeka, treba životinjama obezbjediti 1,5% mediciranog premiksa na

ukupnu živu masu životinja koje se tretiraju, a što odgovara 3.700 ppm-a oksitetraciklina/1 kg hrane ili 5 kg lijeka/1 tona hrane.

### UPOZORENJE

#### Posebne mjere opreza kod primjene:

##### 1. Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Zbog mogućih varijacija klime i geografskog područja osjetljivost vrsta mikroba na koje cilja Oksitetraciklin preporuča se da se prvo uradi bakteriološko ispitivanje i test osjetljivosti.

Neodgovarajuća upotreba proizvoda u odnosu na ono što je navedeno u uputstvu mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na oksitetraciklin i smanjiti djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima iz iste ili druge klase zbog moguće pojave unakrsne otpornosti.

##### 2. Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na oksitetraciklin moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom. Ukoliko se nakon primjene pojavila neka reakcija kao osip na koži treba konsultovati liječnika i pokazati etiketu ili prospekt proizvoda.

### NAČIN ČUVANJA

Čuvati u suhoj, mračnoj i prozračenoj prostoriji na temperaturi do 25° C.

### KARENCA

- Ribe:
  - meso: 300 stepeni/dan

### NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

### ROK UPOTREBE

Rok trajanja originalnog pakovanja je 2 godine.

Nakon otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 6 mjeseci.

Nakon rastvaranja veterinarskog lijeka u vodi, rok trajanja je 6 mjeseci.

### NAČIN PAKOVANJA

Vreće od 5 kg i 25 kg.

### UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadu („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-771/16 J.B.; 24.06.2016.

PROIZVOĐAČ: **Filozoo Srl**; Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)  
Tel: +39059637311