

PRIJEDLOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU

PANACUR 10%, 100 i 250 ml; 1, 2, 5 i 10 litara.
Suspenzija za oralnu primjenu.

za primjenu na životinjama

Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija.

Podnosilac
zahteva: INTERVET INTERNATIONAL BV PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH

Adresa: Pijačna 8, Sarajevo.

IME LIJEKA

PANACUR 10%

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL sadrži:

Aktivni sastojci:

Fenbendazol	100 mg
-------------	--------

Pomoćne tvari:

Natrijum metil POB	2,0 mg
Natrijum propil POB	0,216 mg
Benzil alkohol	4,835 mg

INDIKACIJE

Za tretiranje parazitskih infekcija sa nezrelim i zrelim stadijima nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta kod goveda, konja, pasa i mačaka. Ima ovicidni efekat na jajašca valjkastih crva. Takođe je efikasan i protiv trakavica kod goveda.

Za liječenje pasa inficiranih zrelim stadijima valjkastih crva i trakavica gastrointestinalnog trakta te mačaka inficiranih nezrelim i zrelim stadijima valjkastih crva i trakavica gastrointestinalnog trakta.

Konji:

Vrste velikih i malih strongila, askarida, oksipurida i strongilida.

Goveda:

Haemonchus spp. , Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Dictyocaulus spp. i Moniezia spp.

Psi:

Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia Spp .

Mačke:

Toxocara mystax (zreli stadiji), Ancylostoma tubaeformis (zreli stadiji i nezreli stadiji), Taenia Spp (zreli stadiji).

Štenad:

Toxocara spp., Trichuris spp., Ancylostoma spp.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Redovna doza za goveda i konje je 7,5 mg fenbendazola po kg t.t., što odgovara 7,5 ml po 100 kg t.t.

Dijareju uzrokovanu sa *Strongyloides wesleri* kod sišuće ždrebadi treba liječiti dozom od 50 mg fenbendazola po kg t.t.

Za suzbijanje cistiranih mukoznih larvi malih crvenih crva, potrebna je doza od 7,5 mg fenbendazola po kg t.t. dnevno u trajanju od 5 dana.

Redovna doza za pse i mačke je 50 mg fenbendazola po kg t.t. i daje se 3 dana uzastopno ili se umjesto toga može dati jedna doza od 100 mg fenbendazola po kg t.t. (odrasle životinje).

Suspenciju treba dobro protresti prije upotrebe i spremna je za upotrebu bez daljeg razrjeđivanja.

Može se primijeniti na konjima i govedima korištenjem bilo kakvog standardnog dozirnog pištolja ili opreme za brizganje. Za pse i mačke dozu je potrebno pomiješati sa hranom ili primijeniti direktno na usta nakon hranjenja, npr. korištenjem plastične šprice.

SAVJETI ZA PRAVILNU PRIMJENU

Panacur 10% suspenzija se mora protresti prije upotrebe. Za primjenu se mogu koristiti uobičajena oprema za masovno doziranje ili plastična šprica.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ako primjetite bilo kakve nuspojave, kontaktirajte svog veterinara.

KARENCA

Goveda

Jestiva tkiva : 7 dana;

Mlijeko krava: 3 dana.

Konji

Jestiva tkiva: 5 dana.

Lijek se ne upotrebljava kod kobilica čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1362/17 J.B., od 26. oktobra 2017. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: 100 i 250 ml; 1, 2, 5 i 10 litara.

Čuvanje: Ne čuvati iznad 25 °C.

Rok upotrebe: 5 godina na sobnoj temperaturi.

Način izdavanja: Izdaje se na veterinarski recept.

ATC vet kod: QP52AC13

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET INTERNATIONAL B.V, Boxmeer, Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International bv predstavništvo za BiH, Tešanjaska 24A, Sarajevo.