



Pathosone

Intramammarna suspenzija

SASTAV

Jedan intramamarni injektor (10ml) sadrži:

Aktivna supstanca:

Cefoperazone 250mg

Pomoće supstance:

all-rac- α -Tocopherol (E307)

Glycerol monostearat

Sorbitan stearat

Oplemenjeno ulje kikirika

DJELOVANJE

Cefoperazon je treća generacija, polusintetski cefalosporinski antibiotik širokog spektra baktericidnog djelovanja na Gram-počitivne i Gram-negativne bakterije.

Djeluje tako što inhibira sintezu stanične stijenke bakterija. Kao treće generacije cefalosporina, cefoperazon pokazuje veću sposobnost da izdrži razgradnju Betalaktamskih enzima nego što to mogu članovi prve i druge generacije čija djelatnost je u prisustvu beta-laktamaza manje pouzdana.

INDIKACIJE

Liječenje kliničkih mastitisa kod muznih krava izazvanih sa: Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus (uključujući sojeve koji stvaraju penicilinaze), Escherichia coli, Trueperella pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus spp. i Klebsiella spp.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte koristiti u slučaju preosetljivosti na cefalosporine ili na bilo koji od ekscipenasa ili u slučaju teških poremećaja funkcije bubrega.

OBLIK

Intramamarna suspenzija

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Za intramamarnu upotrebu. Jednokratna upotreba. Sadržaj jednog šprica od 10ml treba ubrizgati u inficiranu četvrt vimena odmah nakon muže.

NUSPOJAVE

Nema

NAPOMENA

Po definiciji proizvod je razvijen za upotrebu u laktaciji krava i pokazano je

da je bezbjedan u tom pogledu.

U reproduktivnim studijama nema štetnih otkrića, što bi činilo nebezbjednim ovaj preparat.

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosjetljivost (alergiju) putem ubrizgavanja, inhalacijom, gutanjem ili preko kože. Preosjetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad biti ozbiljne.

Nemojte rukovati ovim proizvodom ako znate da ste osjetljivi.

Rukovati ovim proizvodom uzimajući sve preporučene mjere predostrožnosti. Ako se razviju simptomi, kao što su osip na koži, trebalo bi potražiti savjet ljekara i pokazati ovo upozorenje ljekaru ili uputstvo.

Oticanje lica, usana ili očiju ili teškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pažnju. Oprati ruke poslije upotrebe.

KARENCA

Meso: 2 dana

Mlijeko: 62 sata

NAČIN ČUVANJA

Na tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25 °C) i izvan dosega djece.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Rok upotrebe je otisnut na pakiranju i iznosi 18 mjeseci.

PAKOVANJE

Kutija sa 10 injektora

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-219/15 od 18. marta 2015. godine

PROIZVOĐAČ

Zoetis Manufacturing Italia s.r.l.
(Haupt Pharma Latina S.r.l. Italija)

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo
Dobrinjska do br.27
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina